

Wilayah rawan penyakit filariasis di Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Marwan Surachman Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20179014&lokasi=lokal>

Abstrak

Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) adalah penyakit menular berasal dari cacing *Filaria* dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, bersifat menahun (kronis), dan apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin. Kabupaten Lebak ditemukan 3 daerah endemis yaitu Kecamatan Warunggunung, Maja dan Cipanas dengan penderita klinis maupun laboratoris. Masalah dalam penelitian ialah berapa luas wilayah rawan Filariasis dan bagaimana karakteristik wilayah rawan maupun kasus klinis Filariasis yaitu dengan metode analisis spasial dan deskriptif. Penelitian ini memberikan kesimpulan luas wilayah rawan Filariasis terbesar terdapat di Desa Maja dan terendah di Desa Selaraja. Karakteristik daerah kasus Filariasis di Kabupaten Lebak banyak terdapat di Ketinggian < 500 m dpl, curah hujan tahunan 2500 - 3000 mm/tahun dan kepadatan penduduk 500 - 1000 jiwa/km², begitu juga dengan wilayah rawan Filariasis sama karakteristiknya dengan daerah kasus Filariasis. Tetapi di wilayah rawan Filariasis ada yang masuk kategori kepadatan penduduknya > 1000 jiwa/km², ini menunjukkan akan semakin cepatnya penularan Filariasis di desa tersebut.