

Faktor-faktor yang menyebabkan kekambuhan/relapse pada korban penyalahgunaan NAPZA yang telah mengikuti program rehabilitasi

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276300&lokasi=lokal>

Abstrak

Angka penyalahgunaan NAPZA terutama pada remaja dan dewasa awal terlihat meningkat tajam. Melihat fenomena di atas maka diperlukan upaya penanggulangan yaitu rehabilitasi. Sayangnya harapan program ini untuk menjadikan korban penyalahgunaan NAPZA dapat menjalani kehidupannya lebih optimal kurang tercapai. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa angka kekambuhan NAPZA cukup tinggi yaitu 43,9 % (Pattinson, 1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekambuhan pada korban penyalahgunaan NAPZA adalah sugesti sebanyak 28,35 %, pengaruh teman sebanyak 19,40 %, perasaan malu, rasa bersalah, tidak berguna sebanyak 14,92 %, gangguan psikiatrik/ stres sebanyak 10,45 %, kurang dukungan orang tua dan anggota keluarga yang lain masing-masing sebanyak 8,96 %, sakit fisik dan kurang dukungan teman masing-masing 4,48 %. Faktor lain yang juga berpeluang menyebabkan kekambuhan/ relapse pada korban penyalahgunaan NAPZA adalah usia awal penyalahgunaan NAPZA yang rata-rata adalah remaja, keinginan untuk coba-coba dan ikut-ikutan, prestasi yang menurun, kecanduan, depresi, dan tidak tuntasnya program rehabilitasi yang sebelumnya diikuti oleh responden.