

Identifikasi strategi koping yang digunakan pasien stroke dalam fase rehabilitasi di unit pelayanan khusus stroke

Barus, Eva Ranika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276775&lokasi=lokal>

Abstrak

Strategi koping yang digunakan pasien stroke fase rehabilitasi akan mempengaruhi perilaku pasien dalam menerima adanya perubahan-perubahan setelah serangan stroke seperti kelemahan atau kelumpuhan pada anggota ekstremitas, gangguan penglihatan, gangguan bicara dan gangguan psikologis. Melalui penelitian ini ingin diketahui strategi koping apa yang paling banyak digunakan pasien stroke fase rehabilitasi. Untuk memperoleh jawabannya peneliti menggunakan metode desain deskripsi sederhana, strategi koping yang digunakan pasien dalam mengatasi adanya perubahan setelah serangan stroke, responden penelitian ini sebanyak 30 orang (19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan) dirawat di ruang Unit Pelayanan Khusus Stroke RSUPN Cipto Mangunkusumo. Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua minggu. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden terpilih yang berisi pernyataan tentang cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan-perubahan yang terjadi setelah serangan stroke. Sebelum menyebarkan kuesioner juga dilakukan uji coba kepada tiga orang responden untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner dapat dimengerti atau tidak oleh responden. Dari 30 orang responden ada 61,88 % mempunyai strategi koping negatif terhadap adanya perubahan setelah serangan stroke dan dari 30 responden, 40 % berusia antara 60-69 tahun. 40 % responden mempunyai latar belakang pendidikan SLTA. Strategi koping positif yang dilakukan responden akan memudahkan responden beradaptasi dengan perubahan yang ada dan akan membantu mempercepat proses rehabilitasi.