

engaruh wanita bekerja diluar rumah terhadap kejadian morning sickness pada trimester pertama

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277001&lokasi=lokal>

Abstrak

Morning sickness merupakan gejala mual (nausea) dan muntah (emesis) yang wajar dan sering didapati pada kehamilan trimester pertama. Gejala ini biasanya terjadi pada pagi hari. Morning sickness ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah faktor psikologis. (Ilmu kebidanan, 1994). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wanita bekerja diluar rumah terhadap kejadian morning sickness pada trimester pertama. Dengan menggunakan desain penelitian deskripsi korelasi dengan memilih 17 responden dari populasi wanita bekerja yang berada di lingkungan kampus UI Salemba serta 13 responden dari populasi wanita tidak bekerja yang berada di lingkungan RW 08 kelurahan Lubang Buaya. Setelah melalui analisa data dengan menggunakan uji Fisher Exact didapatkan data bahwa wanita bekerja yang mengalami morning sickness berat sekitar 82,35 %, sedangkan pada wanita yang tidak bekerja sekitar 69,23 %.