

Risiko terjadinya kanker payudara terhadap ibu yang tidak menyusui setelah melahirkan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277232&lokasi=lokal>

Abstrak

Data dari bagian bedah FKUI/RSCM, menunjukkan bahwa dari tahun 1988 sampai 1996, terjadi 566 kasus kanker payudara. Faktor-faktor yang dianggap sebagai risiko terjadinya kanker payudara adalah: usia, genetik, biologis, psikologis, nutrisi, dan hormonal. Wacana inilah yang menjadi fokus dalam penelitian yang berjudul "Risiko Terjadi Kanker Payudara Terhadap Ibu Yang Tidak Menyusui Setelah Melahirkan". Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sederhana, sedangkan responden yang dipilih sebanyak 30 orang responden yang menjalani rawat inap. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada responden dan sesuai dengan kriteria.

Hasil pengumpulan data dianalisa, kemudian diperoleh hasil sebagai berikut, faktor makanan yang berlemak (66.3%) dan faktor tingginya stresor (66.3%) merupakan salah satu risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara. Sedangkan faktor ibu mengetahui manfaat menyusui (96.7%) dan faktor ibu menyusui setelah melahirkan (93,3%) merupakan faktor yang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Seharusnya penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi sangat perlu untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan penelitian yang telah direkomendasikan guna perbaikan mutu pendidikan dan mutu pelayanan bidang keperawatan di masa yang akan datang.