

Tingkat ketergantungan pasien pasca stroke dalam melakukan "ADL's" di Unit Perawatan Khusus Stroke RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Enny Mulyatsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277291&lokasi=lokal>

Abstrak

Stroke adalah suatu keadaan terputusnya atau terhentinya aliran darah ke otak secara tiba-tiba yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi pergerakan, perasaan, memori, perabaan, dan bicara yang bersifat sementara atau menetap. Masalah kesehatan yang timbul akibat stroke sangat bervariasi, tergantung luasnya daerah yang mengalami nekrose atau kematian jaringan dan lokasi otak yang mengalami kelainan. Sebagian besar pasien pasca stroke mengalami gangguan mobilisasi, meskipun tidak semua pasien mengalami hal ini. Akibat mengalami gangguan mobilisasi atau pergerakan pasien mengalami ketergantungan dalam aktifitas sehari-hari atau Activity Daily Livings ("ADL's"). Tingkat ketergantungan dalam melakukan aktifitas sehari-hari ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal, faktor eksternal, usia, kelemahan atau ketidakmampuan akibat stroke, dan pengangkatan posisi serta mobilisasi dini yang dilakukan oleh perawat atau terapis fisik. Pada penelitian ini didapatkan hasil yang menunjukkan, bahwa tingkat ketergantungan pasien pasca stroke lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tingkat ketergantungan pasien pasca stroke yang mengalami ketergantungan total mencapai 50%, dan rata-rata nilai Barrel Index adalah 54,2. Berdasarkan hal ini, diharapkan perawat membuat perencanaan pulang bagi pasien pasca stroke secara tepat, termasuk pemberian pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga, sebelum pasien pulang ke rumah.