

Pengaruh posisi miring 30 derajat terhadap kejadian luka tekan grade I (non blanchable erythema) pada pasien stroke di Siloam Hospitals

Tarihoran, Dame Elysabeth Tutiarnauli, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282630&lokasi=lokal>

Abstrak

Idealnya, perawat memegang peranan yang utama dalam mencegah terjadinya luka tekan pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengaturan posisi miring 30 derajat terhadap kejadian luka tekan grade I (Non Blanchable Erythema) pada pasien stroke di Siloam Hospitals. Penelitian kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol ini menggunakan teknik purposive sampling dengan total 33 responden, masing-masing 16 kelompok kontrol dan 17 kelompok intervensi. Kejadian luka tekan dievaluasi setelah diberikan intervensi posisi miring selama 3x24 jam. Kejadian luka tekan pada kedua kelompok secara statistik sangat signifikan ($p=0.039$), $OR=9.600$, dimana kelompok kontrol berpeluang terjadi luka tekan hampir 10 kali dibanding kelompok intervensi.

..... Ideally, Nurse has a major role as preventing the patient from the development of pressure ulcer. The purpose of this study is to identify the influence of 30 degree laterally positioning on the incidence of grade I (Non Blanchable Erythema) pressure ulcer. Quasi-experimental with control group study using purposive sampling technique involving 33 patients, who divided into 2 groups, control group ($n=16$), and intervention group ($n=17$). The incidence of grade I (Non Blanchable Erythema) pressure ulcer evaluated within 3x24 hours after providing 30 degree laterally positioning. The incidence of pressure ulcer was statistically significant between the group ($p=0.039$), $OR=9.600$, where the control group have an almost 10 times risk for development of grade I pressure ulcer.