

# Analisis faktor-faktor risiko kejadian diare pada anak usia di bawah 2 tahun di RSUD Koja Jakarta = analysis of risk factor for the incidence of diarrhea in children aged under 2 year

Yeni Iswari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282739&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penyakit diare adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia dan di negara berkembang. Berdasarkan profil kesehatan DKI Jakarta 2009, dilaporkan jumlah kasus diare sebesar 164.743 dimana kasus diare 50% terjadi pada balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kejadian diare. Metode penelitian menggunakan rancangan case control, dengan jumlah sampel 54 untuk kelompok kasus dan 54 untuk kelompok kontrol. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan chi square test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi ( $p$  value= 0,037), dan kebiasaan ibu mencuci tangan sebelum memberikan makan pada anak ( $p$  value= 0,038). Rekomendasi perlunya penelitian lebih lanjut dengan.

<hr>

Diarrhea disease is a major cause of morbidity and mortality worldwide and in developing countries. Based on the health profile of DKI Jakarta 2009, the reported number of cases of diarrhea of 164,743 where 50% of diarrhea cases occurred in infants. This study aims to identify and explain factors related to the incidence of diarrhea. This research method using case-control design, with sample size 54 for cases group and 54 for control group. Data analysis was performed univariate, bivariate with chi square test.

The results showed that risk factors affect has a significant relationship with nutritional status ( $p$  value= 0.037), and the habits of mothers wash their hands before providing eating in children ( $p$  value= 0.038). Recommendations that further research is another factor that affects anda is associated with diarrhea.