

Hubungan faktor sosiodemografi, dukungan sosial dan status kesehatan dengan kejadian depresi pada agregat lanjut usia di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali = relationship between sociodemographics factor, social and health status with depression in elderly people at Karangasem district, Karangasem regency of Bali

I Wayan Suardana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282773&lokasi=lokal>

Abstrak

Kejadian depresi dan bunuh diri pada lansia di Karangasem cukup tinggi. Penanganan depresi pada lansia cukup sulit karena kurangnya informasi dari hasil studi yang berhubungan dengan depresi pada lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor sosiodemografi, dukungan sosial dan status kesehatan dengan kejadian depresi pada Lansia di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Bali. Penelitian ini merupakan studi crossectional dengan sampel 163 orang.

Hasil penelitian menemukan variabel yang sangat berhubungan dengan kejadian depresi pada lansia adalah riwayat depresi ($p=0,00$; OR=32,49), penyakit kronis ($p=0,000$, OR= 28,17), dukungan sosial ($p=0,000$, OR= 28,04) dan pendidikan lansia (0,005, OR= 5,85). Penanganan perlu dilakukan secara komprehensif dengan menciptakan regulasi, peningkatan kemampuan perawat, meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat maupun melakukan therapi komunitas, sehingga depresi pada lansia bisa dicegah dan dikurangi.

.....Incidence of depression and suicide in the elderly people in Karangasem is quite high. Treatment for depression in the elderly is quite difficult due to lack of information from the study associated with depression in the elderly. This study aims to determine the sociodemographic factors, social support and health status with the incidence of depression in the elderly people at the district of Karangasem, Bali's Karangasem Regency. This design of this study crossectional with 163 sample .

The study found that variables highly correlated with a histories of depression ($p=0,00$, OR=32,49), incidence of chronic disease ($p = 0.000$, OR = 28,17), social support ($p = 0.000$, OR = 28,04) and level of education $p=(0.005$, OR = 5,85). Handling should be done comprehensively by creating regulations, increased ability nurses, increasing the participation of families and communities as well as doing therapy community, so that the depression in the elderly can be prevented and reduced.