

# Isolasi, elusidasi struktur dan uji aktivitas antioksidan senyawa kimia dari daun *Garcinia benthami* Pierre = Isolation, structure elucidation, and antioxidant activity test of chemical compounds from *Garcinia benthami* Pierre leaves

Puteri Amelia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20289656&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

*Garcinia* termasuk famili Clusiaceae yang mempunyai kontribusi yang besar untuk kesehatan karena mengandung senyawa yang mempunyai bioaktivitas yang potensial diantaranya sebagai antioksidan. Berbagai kandungan kimia dari berbagai spesies *Garcinia* telah dilaporkan, diantaranya senyawa golongan xanton, kumarin, flavonoida dan terpenoid. Salah satu spesies dari genus *Garcinia* yang tumbuh di Indonesia adalah *Garcinia benthami* Pierre. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur senyawa kimia hasil isolasi ekstrak aseton dan metanol dari daun *Garcinia benthami* Pierre, serta melakukan uji antioksidan dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil).

Isolasi senyawa dilakukan dengan teknik kromatografi dan penentuan struktur molekul dilakukan dengan metode spektroskopi: massa (LC-MS), inframerah (IR), UV, resonansi magnet inti proton (<sup>1</sup>H-NMR) dan resonansi magnet inti karbon (<sup>13</sup>C-NMR), DEPT serta spektroskopi NMR-2D (HMQC dan HMBC). Dari data spektroskopi diatas, dua senyawa murni berhasil diisolasi yaitu GBP-1 dan GBP-2. Senyawa GBP-1 yang memiliki rumus molekul C<sub>30</sub>H<sub>50</sub>O diidentifikasi sebagai friedelin dan senyawa GBP-2 yang memiliki rumus molekul C<sub>13</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub> diidentifikasi sebagai 1,3,6,7-tetrahidroksi-xanton. Hasil uji antioksidan dengan metode DPPH pada GBP-1 tidak memperlihatkan aktivitas antioksidan dengan IC<sub>50</sub> 267,51 µg/mL, sementara senyawa GBP-2 memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan IC<sub>50</sub> 8,01 µg/mL.

.....*Garcinia* belong to Clusiaceae family have a large contribution for health, because this family content some potential bioactive compounds among as antioxidants. Chemical contain from some species of *Garcinia* have reported as xanthenes, terpenoids, coumarins and flavonoids. *Garcinia benthami* Pierre is one of *Garcinia* species in Indonesia. This research was intended to isolate, elucidate and measure biological active compounds from acetone and methanol extract of *Garcinia benthami* Pierre leaves.

The isolation was conducted through the chromatographic technique and elucidation structures by spectroscopy: mass spectrometry (LC-MS), infra red (IR), UV, <sup>1</sup>H-NMR, <sup>13</sup>C-NMR and NMR-2D (HMBC and HSQC). as well as to conduct antioxidant test by using DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) method from the isolated compounds. Based on spectroscopy data, two compounds have been found: GBP-1 and GBP-2. GBP-1 which has molecular formula C<sub>30</sub>H<sub>50</sub>O was identified as friedelin and GBP-2 which has molecular formula C<sub>13</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub> was predicted as 1,3,6,7-tetrahydroxy-xanthone. The result of antioxidant test to DPPH on the GBP-1 did not show antioxidant activity IC<sub>50</sub> 267.51 µg/mL and the GBP-2 showed antioxidant DPPH radical scavenging with IC<sub>50</sub> 8.01 µg/mL.