

Gambaran kejadian Anemia pada ibu hamil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat tahun 2012 = Describe prevalence of Anemia during pregnancy and the factors associated with, in sub district Gempol district Cirebon West Java in 2012

Yati Rohayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313814&lokasi=lokal>

Abstrak

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting. Perdarahan adalah salah satu komplikasi persalinan yang menyebabkan masih tingginya kematian maternal di Indonesia. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Kabupaten Cirebon tahun 2011 sebesar 12,4% sedangkan di Kecamatan Gempol kejadian anemia ibu hamilnya sebesar 40,0%.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran kejadian anemia pada Ibu hamil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional, dengan jumlah sampel 205 responden. Hasil penelitian ini didapatkan angka prevalensi anemia pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sebesar 60.5% dan rata-rata kadar haemoglobin ibu hamil sebesar 10.6 gr %.

Dan dari hasil penelitian didapatkan status gizi ibu hamil yang menderita anemia lebih banyak pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis yaitu sebesar 71.8%. Hal ini disebabkan asupan gizi sebelum hamil yang tidak adekuat. Untuk mengatasi masalah anemia pada ibu hamil di Indonesia, perlu perbaikan asupan gizi bagi wanita sejak anak dan remaja.

<hr><i>Anemia in pregnancy is an important public health problem, bleeding is complication of labor that causes the high maternal mortality in Indonesia. Prevalence of anemia in district Cirebon in 2011 about 12.4% and 40,0% in sub district Gempol.

The aim of study to describe prevalence of anemia during pregnancy and the factors associated with, in sub district Gempol district Cirebon West Java in 2012.

This was a descriptive cross sectional study with 205 respondent. The result of prevalence of anemia during pregnant women about 60.5% and the average of haemoglobin level in 10.6 gr%.

The result showed that the nutritional status of pregnancy suffer from anemia in pregnancy women more often than chronic energy shortage that is equal to 71.8%. This is due to pregnancy nutrition is not adequate. To overcome the problem of anemia in pregnancy women in Indonesia need to be improved for women since the nutritional intake of children of adolescents.</i>