

Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal tahun 2012 = Factors associated with exclusive breastfeeding behavioral in the working area Bangun Galih Health Center in the region of Tegal year 2012

Sudjaroh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315668&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah kematian Balita sebanyak 13%. Berdasarkan data Puskesmas Bangun Galih tahun 2010 pencapaian ASI eksklusif sebesar 30% dibandingkan dengan target Depkes RI yaitu 80%.

Tujuan Penelitian ini adalah diketahuinya gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. Desain penelitian adalah cross sectional dengan jumlah sampel 90 orang ibu yang memiliki bayi berusia 6-12 bulan dan bertempat tinggal di Puskesmas Bangun Galih.

Hasil analisis univariat diperoleh ibu yang memberikan ASI eksklusif sebesar 7,8%. Analisis bivariat dari faktor pemungkinkan yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif adalah penyuluhan petugas kesehatan ($POR=7,4$; 95% CI: 0,8-64,7), untuk faktor penguatan yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif adalah dukungan keluarga ($POR=6,9$; 95% CI: 1,2-38,3) dan dukungan dari petugas kesehatan ($POR=10,6$; 95% CI: 1,2-92,2). Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan dari semua pihak agar perilaku pemberian ASI eksklusif oleh ibu-ibu yang menyusui lebih ditingkatkan lagi.

<*i*>Exclusive breastfeeding can prevent the toddler's death as much as 13%. Based on data from the 2010 Bangun Galih Health Center (Puskesmas) achievement of exclusive breastfeeding by 30% compared to the Depkes, the target of 80%.

The purpose of this study is known characteristic factors associated with exclusive breastfeeding. The study design was cross sectional a sample of 90 mothers with babies aged 6-12 months and residing in the Bangun Galih Health Center (Puskesmas).

Univariate analysis results obtained by mothers who exclusively breastfed at 7.8%. Bivariate analysis of enabling factors associated with exclusive breastfeeding is by health workers counseling ($POR = 7.4$, 95% CI: 0.8 to 64.7), reinforcing factors associated with exclusive breastfeeding is families support ($POR = 6.9$, 95% CI: 1.2 to 38.3) and health workers support ($POR = 10.6$, 95% CI: 1.2 to 92.2). The importance of improving the quality of service and support from all parties to exclusive breastfeeding further enhanced.</i>