

Pengaruh intervensi terhadap perilaku pemberian ASI di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 = Effect of interventions against breastfeeding behavioral in Candimulyo Subdistrict, Magelang Regency, Central Java in year 2012

Indria Rositawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20320271&lokasi=lokal>

Abstrak

Cakupan nasional pemberian ASI eksklusif Tahun 2010 sebesar 15,3%, belum mencapai target nasional yaitu 80%. Cakupan Jawa Tengah 37,18%, Kabupaten Magelang 10,90 % dan Puskesmas Candimulyo 7,45%.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan dan pengaruh intervensi berupa penyuluhan dan konseling terhadap perilaku pemberian ASI di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis bivariat berupa uji independensi perilaku pemberian ASI dan variabel-variabel yang berhubungan yang menghasilkan statistik Chisquare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemberian ASI eksklusif oleh responden di Kecamatan Candimulyo signifikan berhubungan dengan variabelvariabel pengetahuan, pekerjaan, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan keluarga. Intervensi signifikan dan sensitif mengubah kemungkinan seorang ibu memberikan ASI pada saat observasi kedua.

Setelah intervensi terdapat 10,5% responden yang kembali memberikan ASI seperti pada ASI eksklusif. Responden yang mendapat penyuluhan dan konseling sebagai intervensi mempunyai kemungkinan memberikan ASI hampir 3 kali lebih tinggi dari yang tidak memperoleh penyuluhan.

<hr><i>National coverage of exclusive breastfeeding of 15.3% in 2010, has not achieved the national target of 80%. Coverage of Central Java Province, Magelang Regency, and Candimulyo Subdistrict respectively were 37.18%, 10.90% and 7.45%.

This study aims to analyze the relationship and the effect of intervention in the form of counseling and counseling of exclusive breastfeeding on breastfeeding behavior in the Candimulyo Subdistrict, Magelang Regency, Central Java Province. The method used is a test of the bivariate analysis of feeding behavior and related variables resulting Chi-square statistics.

The results showed that exclusive breastfeeding behavior by the respondent in the Candimulyo Subdistrict significant associated with variables of knowledge, work, health care worker and family support. Intervention was significant and sensitive to alter the chances of a mother breastfeeding at the time of the second observation.

After the intervention there were 10.5% of respondents who returned to give breast milk as the exclusive breastfeeding pattern. Respondents who receive counseling and exclusive breastfeeding counseling as an

intervention had a chance to breastfeed nearly 3 times higher than that did not receive counseling.</i>