

Durasi pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi di Indonesia / Nurmiati, Besral

Nurmiati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332736&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan risiko kematian bayi. Namun, belum diketahui pengaruh durasi

pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi setelah dikontrol oleh faktor determinan lainnya. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh durasi pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi di Indonesia setelah dikontrol faktor

ibu, faktor bayi, dan lingkungan tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI 2002-2003. Analisis

dilakukan dengan menggunakan regresi cox ganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa durasi pemberian ASI sangat

mempengaruhi ketahanan hidup bayi di Indonesia. Bayi yang disusui dengan durasi 6 bulan atau lebih memiliki

ketahanan hidup 33,3 kali lebih baik daripada bayi yang disusui kurang dari 4 bulan, dan bayi yang disusui dengan

durasi 4-5 bulan memiliki ketahanan hidup 2,6 kali lebih baik daripada bayi yang disusui kurang dari 4 bulan, setelah

dikontrol dengan jumlah balita dalam keluarga dan tempat tinggal. Faktor lain yang berpengaruh terhadap ketahanan

hidup bayi di Indonesia adalah jumlah balita dalam keluarga dan tempat tinggal. Oleh karena itu, semua pihak

diharapkan mendukung kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan untuk terus meningkatkan lama

pemberian ASI bahkan sampai 24 bulan.

Breastfeeding can decrease risk of infant

death. But, it is not clear yet the effect of breastfeeding duration to the infant survival after controlled for the other

determinant factors. This research is aimed to know the effect of duration of breastfeeding to infant survival in

Indonesia after controlled for mother, infant, and environment factors. Data was analyzed by using multiple cox

regression models. The result showed that duration of breastfeeding had a significant effect to infant survival in

Indonesia. Infant who breastfeed for 6 months or more had 33.3 better survival than those who breastfeed

less than 4

months. Infant who breastfeed for 4-5 months had 2.6 time better survival than those who breastfeed less than 4 months.

Others determinant of infant survival in Indonesia are the number of under five year children in family and their

residence. Its recommended to all party were expected to support the policy conducted by Department of Health to

improve the duration of breastfeeding up to 24 months