

# Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyalahgunaan ulang (relapse) opiat pada pasien ketergantungan opiat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta tahun 2003-2005

Akhmad Muttaqin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342335&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

**Latar Belakang:** Tingginya angka kambuh (relapse) pada para pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) secara umum diasumsikan tidak akan berbeda jauh dengan angka relapse pada para pecandu jenis opiat. Masih saja angka relapse terbilang tinggi, bahkan dapat dikatakan penyalahgunaan ulang (relapse) opiat tersebut merupakan penyakit kronik yang berkali-kali muncul. Dari studi Pattison E.M (1980) yang dikutip Hawari (2000) menunjukkan bahwa angka relapse cukup tinggi yaitu 43,9%.

**Tujuan:** Diketahuinya faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya relapse pada pasien ketergantungan opiat di RSKO Jakarta tahun 2003-2005, menggunakan data sekunder (data rekam medik pasien). Variabel-variabel yang diteliti yaitu faktor individu (jenis keiamin, tingkat pendidikan, golongan umur, status perkawinan, status pekerjaan, dan status infeksi hepatitis) serta faktor vat (pola punggunaan, lama pakai, cara pakai, iieuensi pakai, dan kadar Zat).

**Rancangan Penelitian:** Penelitian epidemiologi observasional analitik kasus kontrol.

Metode Sampel yang didapatkan 72 kasus dan 84 kontrol, kemudian dilakukan mndom menggunakan simple random sampling dengan dipilih 72 kasus dan 84 kontrol (1:1). Kasus adalah pasien ketergantungan opiat yang menurut catatan dari buku rekam medis; berkunjung berturut-tumt 6 bulan tanpa menggunakan opiat dan kembali berkunjung dengan keluhan kembali menyalahgunakan opiat, kontrol adalah pasien ketergantungan opiat yang menurut catatan dari buku rekam medik berkunjung berturut- turut 6 bulan tanpa menggunakan opiat dan tetap berkunjung tanpa ada keluhan menyalahgunakan opiat. Data dianalisis menggunakan software komputer secara bivariat dan multivariat.

**Hasil:** Variabel yang berhubungan dengan terjadinya relapse opiat antara lain tingkat pendidikan, status perkawinan, status hepatitis, lama pakai, dan cara pakai. Sedangkan variabel yang paling dominan adalah status hepatitis, aninya pasien yang menderita hepatitis lebih berisiko untuk relapse dibandingkan pasien yang tidak menderita hepatitis setelah dikontrol variabel lain.

**Saran:** RSKO dapat memberikan pelayanan khusus bagi pasien perempuan serta di bagian rekam rnedik perlu membuat format kajian (pertanyaan) yang lebih lengkap terutama faktor lingkungan sekitar pasien serta penyimpanan data seharusnya sudah menggunakan komputerisasi. Pada pasien diharapkan dapat mengenali diri sendiri terhadap kondisi saat ini sehingga mampu mengatasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya relapse. Program studi diharapkan menjadi inisiator penelitian yang lebih mendalam, serta pada peneliti lain diharapkan menyertakan faktor lingkungan dan dilakukan dengan desain kohort prospekry dengan jumlah sample yang lebih memadai.

<hr><i>Background: It is assumed that the high rate on relapse among drugs addictive in general (addicted to narcotics, psychotropic, and other substances/NAPZA) will not be different with the rate of relapse on opiate addictive. However, relapse occurrence on opiate addictive is relatively high and can be said as chronically disease that always relapse and relapse again. Study by E. M. Pattison (1980) cited by Hawari (2000) showed that relapse rate of the opiate is as high as 43.9%.

Objective: To find out factors related to the occurrence of opiate relapse among opiate addictive patients at the drugs addiction hospital (RSKO) in Takana 2003 - 2005. Study is using secondary data of patient's medical record. Variables of the study are consist of individual factors (sex, age, level of education, marriage status, occupational status, and hepatitis infection status); and substance factors (substance use practical patterns, duration of substance use, way of employ, frequency of using, and level of substance concentration).

Study Design: The study is an analytic observational epidemiology research that using a case-control design.

Method: Sample is achieved by a simple random sampling and it's comprised of 72 cases and 84 controls (1z). The case is defined as an opiate addictive patient, who has record on being clean from opiate for six months, but returning to RSKO because of opiate relapse. Meanwhile, the control is an opiate addictive patient, who has record on being clean from opiate and visiting RSKO regularly in six months, and still visiting RSKO without any medical problem of being opiate relapse. Data is analyzed by using statistical software on the computer in bivariate and multivariate analysis.

Result: Variables related to the occurrence of opiate relapse are: level of education, marriage status, hepatitis status, the duration of using substance, and the way of employing the substance use. And the most dominant variable is the hepatitis status, which is mean that patient suffer from hepatitis is more likely to be relapse compare to patient without hepatitis, after it controlled by other variables.

Suggestion: RSKO can address special services towards female patient. For the medical record unit, there is a need on improving the assessment forms, especially the assessment of factors surrounding the patient's environment. It is also suggested that patient's data storage is should be computerized. To the patients, it is suggested to be having more self contentment. Therefore, they have the ability to deal with any problems that trigger the occurrence of relapse. To the study program, it is expected that the program could be as an initiator for other intense and profound research, and other researcher should includes the environ factors and using design of prospective cohort with adequate sample size.</i>