

Analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pre-eklampsia berat pada ibu hamil di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

Lia Yulianti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342346&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, angka kejadian pre-eklampsia berat (PEB) pada ibu hamil di RSUD Bayu Asih Purwakarta teljadi peningkatan dari 15,2% menjadi 23,6%. Tingginya angka kejadian PEB ini dipercirikan karena faktor pendidikan, pekerjaan, umur ibu, paritas, umur kehamilan, riwayat penyakit, dan pemeriksaan antenatal. Oleh karena itu dilakukan Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Pre-Eklampsia Berat pada Ibu I-Iamil di RSUD Bayu Asih Purwakarta.

Desain penelitian ini adalah case comrol pada 133 kasus ibu dengan pre-eklampsia berat (PEB) dan 133 kontrol ibu dengan non PEB di RSUD Bayu Asih Purwakarta tahun 2004-2005. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor umur ibu, riwayat penyakit, dan pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kejadian PEB. Sedangkan faktor-faktor pekerjaan, paritas, umur kehamilan, dan pemeriksaan antenatal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian PEB. Sedangkan faktor yang paling berhubungan dengan kejadian PEB adalah riwayat penyakit.

Berdasarkan hal di atas perlu dilakukan penyuluhan pada ibu hamil (khususnya ibu yang berumur >35 tahun dan primigravida) dan ibu yang telah mengalami PEB agar mampu mendeteksi secara dini gejala dan tanda PEB dan segera mencari layanan kesehatan. Rumah sakit juga harus melengkapi pengisian data dalam Erekam medis pasien agar dapat memberikan tindakan medis yang sesuai dan tepat.

<hr><i>In the year 2004 until 2005, the condition severe preeclampsia to pregnant woman in RSUD Bayu Asih Purwakarta have increase from 15,2% to 23,6%. The reason of the increasing severe preeclampsia is estimated because factors education, job, mother age, parity, pregnant age, illness and antenatal care.

Because of that, need analysis the factors that relationship between severe preeclampsia to pregnant woman in RSUD Bayu Asih Purwakarta.

The design of this research is case control, to 133 case mother with severe preeclampsia and 133 control mother non severe preeclampsia in RSUD Bayu Asih Purwakarta year 2004-2005. The data analysis uses logistic regression analysis.

This research found that factors mother age, illness, and education have relationship between severe preeclampsia. About factors job, parity, age pregnant, and antenatal care don't have relationship between severe preeclampsia. The illness is the most relationship factor to become severe preeclampsia.

According to the matter above, pregnant woman (specially age more than 35 year and primigravida) and pregnant woman with several preeclampsia, they need information about syndrom and sign several preeclampsia so they can search the health service. The hospital must doing the full report information about medical clinic patient, so they can get the comprehensif health service.</i>