

# Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Tuberkulosis Multidrug Resistant (TB-MDR) di RSUP Persahabatan Jakarta Tahun 2013 = Factors related to Multidrug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) at RSUP Persahabatan Jakarta 2013

Lia Alfiana Fauziah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20345373&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia baik dalam hal prevalensinya maupun masalah-masalah lainnya yang ditimbulkannya. Upaya dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis masih terus dilakukan. Namun dalam perjalanannya banyak hambatan dalam upaya tersebut, salah satunya adalah adanya fenomena tuberkulosis multidrug resistant (TB-MDR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian TB-MDR. Desain penelitian yang digunakan adalah kasus-kontrol dengan populasinya pasien TB di RSUP Persahabatan tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian TB-MDR di RSUP Persahabatan adalah umur (OR 1,7; 95% CI 0,7-4,1), konsumsi alkohol (OR 1,5; 95% CI 0,5-4,5), riwayat kontak TB (OR 2,1; 95% CI 0,8-5,2), kepatuhan minum obat (OR 10,8; 95% CI 4,4-26,8), status gizi (OR 3,3; 95% CI 1,4-7,8) dan diabetes mellitus (OR 2,1; 0,7-5,8). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program DOTS, penderita TB harus terus dimonitoring dan dikontrol selama pengobatannya terutama dalam hal kepatuhan dalam minum obat.

.....Tuberculosis remains a major problem of public health in Indonesia, both in terms of prevalence and other problems it causes. An attempt of the tuberculosis prevention is still underway. But along the way there are a lot of obstacles in it, one of which is a phenomenon of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). This study intended to find the factors that affecting the MDR-TB. The design study is a case-control and the population is patients with TB at RSUP Persahabatan in 2013.

This study found that affected is the factors in MDR-TB at RSUP Persahabatan are the age (OR 1.7; 95% CI 0.7-4.1), alcohol consumption (OR 1.5; 95% CI 0.5-4.5), history of TB contact (OR 2.1; 95% CI 0.8-5.2), medication compliance (OR 10.8; 95% CI 4.4-26.8), nutritional status (OR 3.3; 95% CI 1.4-7.8) and diabetes mellitus (OR 2.1; 95% CI 0.7-5.8). The study showed that to support the implementation of DOTS program, TB patients should be closely monitored and controlled during treatment, especially in terms of medication compliance.