

Pengaruh terapi metakognitif terhadap intensitas waham dan kemampuan metakognitif di RSJ Prof. DR. Soeroyo Magelang = The influence of metacognitive therapy to delusion intensity and metacognitive ability on Mental Hospital Prof. DR. Soeroyo Magelang

Erna Erawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348595&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Waham merupakan masalah keperawatan yang menempati peringkat kelima di RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang dan penanganan waham dengan terapi metakognitif belum pernah dilakukan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang pengaruh terapi metakognitif terhadap intensitas waham dan kemampuan metakognitif pada klien skizofrenia di RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang. Metode penelitian adalah ?Quasi experimental pre-post test with control group? dengan intervensi terapi metakognitif. Pengambilan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner karakteristik responden, intensitas waham dan kemampuan metakognitif. Terapi metakognitif dilakukan pada kelompok intervensi dengan delapan kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan penurunan intensitas waham dan peningkatan kemampuan metakognitif secara bermakna ($p < 0,05$) pada kelompok intervensi. Penurunan intensitas waham dan peningkatan kemampuan metakognitif pada klien yang mendapatkan terapi metakognitif lebih besar secara bermakna ($p < 0,05$) dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan terapi metakognitif. Peningkatan kemampuan metakognitif berhubungan secara bermakna ($p < 0,05$) dengan penurunan intensitas waham pada kelompok yang mendapatkan terapi metakognitif. Direkomendasikan untuk menerapkan terapi metakognitif pada klien skizofrenia dengan waham di RSJ oleh perawat yang mempunyai kompetensi.

<hr>

ABSTRACT

Delusion ranked fifth in Mental Hospital Prof. Dr. Soeroyo Magelang and metacognitive therapy never done to schizophrenia clients with delusions in Indonesia. The aim of this research was to describe comprehensive by the influence of metacognitive therapy on delusion intensity and metacognitive ability. Design of this research was using ?Quasi experimental pre-post test with control group by using purposive sampling procedure. A sample consist of 26 respondents as intervention group dan 26 respondents as control group. Metacognitive therapy was administered individually with eight sessions for intervention group and therapy as usual for control group. The results of this research depicted that the delusion intensity and metacognitive abilities have improved significantly ($p < 0,05$) on intervention group. Intensity delusion and metacognitive abilities for intervention group was

compared with control group showed the significant different (p value < 0,05). There were correlations between intensity delusion and metacognitive ability (p value < 0,05). The recommendations of this research findings to conduit were to conduct metacognitive therapy regulary for schizophrenic client with delusion, and ensure it is practiced by a qualified nurse.