

Hubungan konsistensi penggunaan kondom dengan kejadian infeksi Gonore pada WPSL di 11 provinsi Indonesia tahun 2011 : analisis data sekunder Survey Terpadu Biologis dan Prilaku tahun 2011 =
Association consistency of condom use with the prevalence Gonorrhea infection in women seks workers directly in 11 province Indonesia in years 2011 : secondary data analysis of Integrated Biological and Behavior Survey 2011

Anisah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349464&lokasi=lokal>

Abstrak

Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh *Neisseria gonore* yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher Rahim dan rectum. Pada wanita Gonore bisa naik kesaluran kelamin menginfeksi selaput didalam panggul sehingga 49 % timbul nyeri panggul dan gangguan reproduksi serta menjadi factor resiko penting dalam tranmisi HIV (Kemenkes RI). Di Indonesia Gonore merupakan jenis IMS yang tertinggi berdasarkan data yang ada pada WPS. Prevalensi Gonore pada WPS 49 % (IBBS 2007). Gonore merupakan indikasi biologis tentang perilaku seks beresiko dan banyak terjadi di industry seks komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Konsistensi Penggunaan kondom dengan kejadian infeksi Gonore pada Wanita penjaja Seks Langsung (WPSL). Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Sumber data hasil Survey terpadu Bilogis dan Prilaku tahun 2011. Populasi adalah wanita penjaja seks langsung (WPSL) Di 11 Provinsi Indonesia. Jumlah sampel adalah 3.324..Hasil Penelitian prevalensi Gonore pada WPSL adalah 37,69 %.Sebagian WPSL tidak Konsisten menggunakan kondom 72,4%.Hasil analisis multivariat menunjukan bahwa terdapat hubungan PR 1.072 (95 % CI 0,917-1,253). Peningkatan Konsistensi penggunaan kondom dan perubahan prilaku.

<hr><i>Gonorrhea is sexually transmitted disease caused by *Neisseria gonorrhea* that infect the inner lining of uretra,cercix and rectum.In women gonorrhea can infect the genital tract up to the membrane in the pelvis so that the 40 % and pelvic pain and reproductive problems as well as being an important risk factor in HIV transmission(Kepmenkes RI). In Indonesia ,gonorrhea is the highest type of STI prevalence data based on 49 % of gonorrhea in the FSW (IBBS 2007) and 37,8 % (IBBS 2011),Gonorrhea is considered as an indication of biological resources in risky sexual behavior and still a lot happening in the commercial sex industry.

This study aims to determine the relationship the consistency of condom use with the incidence of gonorrhea infection in female sex workers directly (WPSL).This study uses cross-sectional study design.Data is collected secondary data results of integrated Biological and Behavior Survey in 2011.Population is female direct sex workers in 11 Province Indonesia .Number sampel is 3.324.The Study found that prevalensi of gonorrhea infection in female sex workers directly (WPSL) by 37,69 % .most of the WPSL is inconsistent use of condom 72,4%.The results of bivariate analysis showed that there was no significant relationship between the consistency of condom use with the prevalence of gonorrhea infection PR 1.072 (95 % CI 0,917-1,253).increase particularly the consistent use of condom and increased opportunities use condoms.</i>