

Studi Taksonomi *Candida* spp. dari *Apis cerana* Fabricius dan dari Bunga-bunga yang Dikunjunginya di Ciburial, Jawa Barat = Taxonomical Study of *Candida* spp. from *Apis cerana* Fabricius and Their Visiting Flowers in Ciburial, West Java

Purba, Murniati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20350208&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada penelitian sebelumnya, diperoleh 18 strain *Candida* spp. dari *Apis cerana* dan bunga-bunga yang dikunjunginya di Ciburial, Jawa Barat. Hasil identifikasi berdasarkan data sequence daerah ITS rDNA menggunakan primer reverse ITS4, menunjukkan bahwa 18 strain tersebut memiliki homologi rendah (85--98%) terhadap spesies terdekatnya *Candida* spp. Dengan demikian belum diperoleh identitas yang akurat dari 18 strain *Candida* spp. tersebut.

Penelitian bertujuan untuk memperoleh identitas yang akurat dari 18 strain tersebut melalui identifikasi molekuler, analisis filogenetik, dan pengamatan karakter fenotipik (morfologi, fisiologi, dan biokimia). Identifikasi dilakukan melalui sequencing pada daerah ITS rDNA dan D1/D2 LSU rDNA. Analisis filogenetik dilakukan berdasarkan data sequence daerah ITS rDNA dan D1/D2 LSU rDNA, menggunakan metode neighbor-joining.

Berdasarkan hasil identifikasi molekuler, analisis filogenetik, dan pengamatan karakter fenotipik, 10 strain diidentifikasi ke dalam 5 spesies, yaitu *C. parapsilosis* (*Candida* sp. CR033, CR034, dan CR038), *C. orthopsilosis* (*Candida* sp. CR015 dan CR151), *C. metapsilosis* (*Candida* sp. CR047 dan CR053), *Debaryomyces hansenii* (*Candida* sp. CR065), dan *Wickerhamomyces anomalus* (*Candida* sp. CR070 dan CR105). Sebanyak 8 strain (*Candida* sp. CR004, CR007, CR013, CR014, CR018, CR023, CR027, dan CR035) belum dapat ditentukan nama penunjuk (epithet) spesiesnya. Berdasarkan sequence ITS rDNA 8 strain tersebut memiliki homologi yang rendah (97%) terhadap kerabat terdekatnya *C. hawaiiiana*.

Pohon filogenetik berdasarkan sequence ITS rDNA menunjukkan 8 strain tersebut berada pada clade yang terpisah dengan *C. hawaiiiana* dengan dukungan nilai bootstrap yang sangat tinggi, 99%. Delapan strain *Candida* tersebut termasuk dalam satu spesies yang memiliki perbedaan sequence 1% antara satu strain *Candida* dengan strain *Candida* lainnya atau disebut conspecific. Karakter fisiologi dan biokimia menunjukkan 8 strain tersebut memiliki perbedaan dengan *C. hawaiiiana* CBS 9146T pada kemampuannya mengasimilasi sumber karbon - methyl -D-glucoside, dan ketidakmampuannya mengasimilasi ribosa. Hasil identifikasi penelitian menunjukkan bahwa 8 strain *Candida* tersebut merupakan spesies yang berbeda dengan *C. hawaiiiana*.

.....

In the previous study, 18 strains of *Candida* spp. were obtained from *Apis cerana* and their visiting flowers in Ciburial, West Java. Based on sequence data of ITS rDNA using ITS4 reverse primer, these strains showed low homology (85--98%) to their closest relatives *Candida* spp. Therefore, the identity of these 18 strains were not established yet.

The purpose of this study was to establish the identities of the 18 strains of *Candida* spp. by conducting molecular identification, phylogenetic analysis, and phenotypic characterization (morphological, physiological, and biochemical characters). Identification and phylogenetic analysis was carried out by

sequencing the ITS rDNA and D1/D2 of LSU rDNA. Phylogenetic tree was constructed using neighbor-joining method.

Based on molecular identification, phylogenetic analysis, and phenotypic characterization, 10 strains were identified into 5 species. Those 10 strains were identified as *C. parapsilosis* (*Candida* sp. CR033, CR034, and CR038), *C. orthopsilosis* (*Candida* sp. CR015 and CR151), *C. metapsilosis* (*Candida* sp. CR047 and CR053), *Debaryomyces hansenii* (*Candida* sp. CR065), and *Wickerhamomyces anomalus* (*Candida* sp. CR070 and CR105). The identities of eight strains (*Candida* sp. CR004, CR007, CR013, CR014, CR018, CR023, CR027, and CR035) were not established yet. Based on sequence data of ITS rDNA they have low degree of homology (97%) to their closest related species, *C. hawaiiensis*.

Phylogenetic tree based on sequence data of ITS rDNA showed they were separated from *C. hawaiiensis* by 99% bootstrap value. Multiple alignment of their sequences of ITS and D1/D2 showed that they have 1% differences, which indicate that these strains are conspecific (same species). Their morphological, physiological and biochemical characteristics showed that these strains differed from *C. hawaiiensis* CBS 9146T by their ability to assimilate -methyl-D-glucoside and their inability to assimilate ribose as carbon sources. Our data suggest that these strains were distinct species from *C. hawaiiensis*.