

Analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler: Congestive heart failure, di Ruang Rawat Kardiovaskuler, Lantai 6 Zona B, RS. Dr. Cipto Mangunkusumo, Tahun 2013 = Analysis of clinical nursing practice of urban public health in patient of congestive heart failure in Cardiovascular Room Care Floor 6 Zone B, RS. Dr. Cipto Mangunkusumo

Laila Hasanah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20351516&lokasi=lokal>

Abstrak

Congestive heart failure merupakan suatu sindrom kompleks yang disebabkan karena gangguan dari struktur maupun fungsi jantung sehingga mengakibatkan gangguan fungsi pompa jantung sebagai pendukung sirkulasi fisiologi manusia. Sindrom heart failure dapat ditandai dengan adanya keluhan sesak nafas, kelelahan, dan terjadinya retensi cairan. Pasien congestive heart failure dengan keluhan sesak nafas akan mengalami perburukan kondisi yang cepat dan tak terkira jika tidak segera ditangani.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pemberian posisi semi fowler untuk mengurangi sesak nafas pada pasien congestive heart failure.

Metode: Studi kasus dilakukan dengan pendekatan evidence based practice. Implementasi dilakukan selama pasien mengeluhkan adanya sesak.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan keluhan sesak yang dilaporkan oleh pasien selama pemberian posisi semi fowler.

Kesimpulan: Pemberian posisi semi fowler mampu menurunkan keluhan sesak pada pasien yang ditunjukkan dengan adanya perubahan laju pernafasan menjadi mendekati nilai normal (20-24 x/menit).

.....Congestive heart failure is a complex syndrome that can result from any structural or functional cardiac disorder that impairs the ability of the heart to function as a pump to support a physiological circulation. The syndrome of heart failure is characterized by symptoms such as breathlessness, fatigue, and fluid retention. Patients who have congestive heart failure with breathlessness, they may worsen rapidly and unpredictably if they do not have quick treatment.

Purpose: Aim of study is to analyzing the effect of semi fowler position to reduce breathlessness from patients who have congestive heart failure.

Methode: The case study conducted by evidence based practice approach. Implementation is done for patients with breathlessness.

Result: The results showed that the decrease of breathlessness were report by the patient during administration of semi fowler position.

Conclusion: Giving semi fowler position can reduce breathlessness of the patients indicated by change in respiratory rate to near normal value (20-24 x/minute).