

Analisis praktik klinik keperawatan anak kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien diare di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati= The analysis of child nursing clinical practice of urban public health nursing at children with diarrhoea in Fatmawati Hospital

Mariska, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20351572&lokasi=lokal>

Abstrak

Diare menempati urutan kedua pembunuh anak di bawah umur lima tahun di dunia. Diare merupakan suatu gejala hasil dari kelainan pada proses digestif, absorpsi, dan fungsi sekresi. Penulisan karya ilmiah akhir ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan terapi pijat pada penurunan frekuensi BAB penderita Diare. Aplikasi dilakukan pada dua anak sebagai responden/intervensi dan satu anak sebagai responden non-intervensi. Hasil penerapan terapi pijat ini didapatkan bahwa terdapat penurunan frekuensi BAB pada anak dengan diare setelah dilakukan terapi pijat. Hasil penerapan aplikasi ini menyarankan institusi pelayanan kesehatan dapat mempertimbangkan dalam penerapan terapi ini sebagai terapi komplementer. Kemudian, terapi komplementer dapat dijadikan salah satu mata kuliah praktik pada mahasiswa keperawatan.

.....

Diarrhoeal disease is the second leading cause of death in children under five years old. Diarrhoea is a symptom which is the result of disruption in digestive process, absorption, and secretion. The objective of this study was to ascertain the effect of massage therapy in decreasing defecation frequency on children with diarrhoea. Samples for this study were two children as intervention respondents, and one child as a non-intervention respondent. Result of this study indicated that there is an effect in decreasing defecation frequency in children who had been through a massage therapy. This study suggest that a health care institution should consider this therapy to be applied as a complementer therapy. Furthermore, the complementary therapy could be conducted as a practical lesson for nursing students.