

Pemberian nutrisi melalui continuous feeding untuk menghindari gejala gastro-oesophageal reflux pada klien dengan gastrektomi = Providing nutrition through continuous feeding to avoid gastro-oesophageal reflux symptoms in clients with gastrectomy

Lidia Nafratilofa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20351592&lokasi=lokal>

Abstrak

Kanker lambung adalah penyebab paling umum kedua kematian terkait kanker secara global. kejadian global diprediksi naik sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ditandai dengan variasi geografis dalam kejadian kanker lambung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian nutrisi melalui drip atau continuous feeding untuk menghindari gejala gastro-oesophageal reflux dapat diterapkan pada pasien gastrektomi untuk mengatasi kekurangan nutrisi pada pasien.

Metode studi kasus dengan pendekatan evidenced based practice yaitu menggunakan penelitian sebagai dasar dalam praktik asuhan keperawatan pada klien dengan gastrektomi dapat mengurangi gejala gastro-oesophageal reflux yaitu mual dan muntah sehingga evidence based practice tersebut bisa diterapkan pada pemberian nutrisi enteral pada klien gastrektomi sehingga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d mual dan muntah dapat teratasi.

.....

Gastric cancer is the second most common cause of cancer-related deaths globally. Global incidence is predicted to increase as a result of population growth, characterized by geographical variation in the incidence of gastric cancer. This study aims to determine the provision of nutrition or continuous drip feeding through to avoid the symptoms of gastro-oesophageal reflux in patients with gastrectomy can be applied to address nutritional deficiencies in patients.

The case study method with evidenced based practice approach is to use research as a basis for the practice of nursing care to clients with gastrectomy may reduce symptoms of gastro-oesophageal reflux are nausea and vomiting so that evidence-based practice can be applied to enteral nutrition on the client so that the imbalance nutrition less gastrectomy than body requirements; nausea and vomiting can be resolved.