

# Prediksi ukuran lebar enam gigi anterior rahang atas berdasarkan jarak interalar intercanthal dan intercomissural = Prediction of six maxillary anterior teeth width based on interalar intercanthal and intercommissural width

Hendrik, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364659&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Penentuan lebar enam gigi anterior rahang atas cukup menyulitkan, terutama bila tidak terdapat catatan pra ekstraksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan rumus untuk membantu memprediksi lebar enam gigi anterior rahang atas dengan pengukuran fasial tertentu diantaranya : jarak interalar, jarak intercanthal, dan jarak intercomissural, dan untuk menentukan korelasi antara lebar enam gigi anterior rahang atas dengan pengukuran fasial yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di RSKGM UI dengan jumlah subjek sebanyak 60 orang terdiri dari 36 wanita dan 24 laki laki. (Persetujuan etik FKG UI, Jakarta, 26 Maret 2013 Nomor: 19/Ethical Clearance/FKG UI/III/2013). Tiap subjek dilakukan pengukuran jarak interalar, jarak intercanthal, jarak intercomissural dan lebar enam gigi anterior rahang atas dengan menjumlahkan lebar masing masing gigi anterior rahang atas. Korelasi koefisien Pearson dan Spearman digunakan untuk menentukan korelasi antar variabel dan hasilnya menunjukkan adanya korelasi signifikan antara lebar enam gigi anterior rahang atas dengan jarak interalar, jarak intercomissural, dan jenis kelamin. Dari hasil analisis multivariat dapat diperoleh suatu rumus untuk memprediksi lebar enam gigi anterior rahang atas yaitu  $38,27 + 2,011 \times (\text{jenis kelamin}) + 0,167 \times (\text{jarak intercomissural})$ , dengan memasukkan angka 1 untuk jenis kelamin perempuan dan angka dua untuk jenis kelamin laki laki. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran fasial terurama jarak intercomissural dan jenis kelamin dapat digunakan untuk memprediksi lebar enam gigi anterior rahang atas.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

It is difficult to determine the width of six maxillary anterior teeth especially when pre-extraction record are not available. Therefore, this clinical study was carried out to determine a formula to predict the width of six maxillary anterior teeth using certain facial measurements which included interalar, intercanthal, and intercomissural width, and to determine the correlation between width of six maxillary anterior teeth with other facial measurements. This clinical study was performed in RSKGM UI with total subject of 60 people consist of 36 female and 24 male. (Ethical approval from Faculty of Dentistry University Indonesia on march 26th 2013, No: 19/Ethical Clearance/FKG UI/III/2013). Each subject was measured for interalar, intercanthal, intercomissural width and the width of six maxillary anterior teeth was determined by adding mesiodistal width of each maxillary anterior teeth. Pearson and Spearman correlation coefficient was used to determine the correlation between all variables and shows significant correlation between width of six maxillary anterior teeth and interalar width, intercomissuralwidth , and sex. Based on the result from multivariate analysis, a formula can be determine to predict the width of six maxillary anterior teeth which is  $38,27 + 2,011 \times (\text{sex}) + 0,167 \times (\text{intercomissural width})$ , with no 1 as data input for female and no 2 as data input for male subject. Based on the outcome results, it can be concluded that facial measurements,

especially intercommissural width and sex, can be used to predict width of six maxillary anterior teeth.