

Faktor-faktor yang berhubungan dengan perceived stigma tentang penyakit kusta pada orang yang pernah mengalami kusta di perkampungan kusta, Sitanala, Tangerang, tahun 2013 = Factors related to perceived stigma of leprosy in leprosy villages, Sitanala, Tangerang, 2013

Erni Astutik, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365183&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Kusta merupakan penyakit Neglected Tropical Diseases (NTDs) yang menjadi masalah global yang menyebabkan perceived stigma pada orang yang mengalaminya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perceived stigma dan faktor yang paling dominan mempengaruhinya pada orang yang pernah mengalami kusta di perkampungan kusta Sitanala, Tangerang tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Desain yang digunakan adalah cross-sectional. Sampel dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan perceived stigma adalah tingkat pendidikan ( $OR_1=3,45$  95% CI 1,08-11,06 dan  $OR_2=2,47$ , 95% CI 0,9-6,82), persepsi pengetahuan, tingkat cacat, dan nilai budaya ( $OR=3,36$ , 95% CI 2,02-5,61).

Terdapat efek modifikasi antara tingkat cacat dengan persepsi pengetahuan,  $OR_1=4,82$ (95% CI 1,26-18,34) dan  $OR_2=1,18$ (95% CI 0,2-6,98). Faktor dominan adalah tingkat pendidikan dengan PAR%=38,8%. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi, penyuluhan, dan konseling mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perceived stigma tentang penyakit kusta sehingga dapat menurunkan perceived stigma.

.....Leprosy is a disease of Neglected Tropical Diseases (NTDs) that becomes a global problem and causes the perceived stigma in people affected by leprosy. This study aims to determine the factors and the most dominant factor that related to perceived stigma in people affected by leprosy in leprosy villages Sitanala, Tangerang in 2013.

This research was conducted with quantitative and qualitative approaches. Using cross-sectional design. Samples were selected by purposive sampling. The results of the study showed that factors related to perceived stigma are level of education ( $OR_1=3,45$  95% CI 1,08-11,06 and  $OR_2=2,47$  95% CI 0,9-6,82), perception of knowledge about leprosy, level of disability, and cultural values ( $OR=3,36$ , 95% CI 2,02-5,61).

There is effect modification between the level of disability and perception of knowledge about leprosy,  $OR_1=4,82$ (95% CI 1,26-18,34) dan  $OR_2=1,18$ (95% CI 0,2-6,98). The dominant factor is level of education, PAR%=38,8%. Therefore it is necessary for intervention, counseling to factors related to perceived stigma about the leprosy so as to decrease the perceived stigma.