

# Perbandingan kadar magnesium serum pada preeklampsia dan kehamilan normal = Comparison between serum magnesium level in preeclampsia and normal pregnancy

Panjaitan, Bintang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365405&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Tujuan penelitian cross sectional comparative ini adalah diketahuinya perbandingan antara kadar magnesium serum pada preeklampsia dan kehamilan normal. Pengumpulan data dilakukan di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi dan Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan pada bulan Oktober sampai November 2013. Sebanyak 46 orang ibu hamil yang terdiri dari 23 orang dengan preeklampsia dan 23 orang dengan kehamilan normal yang memenuhi kriteria inklusi menyatakan kesediaannya mengikuti penelitian ini. Data diperoleh dari wawancara, pengukuran tekanan darah dan lingkar lengan atas, evaluasi asupan magnesium dengan metode FFQ semikuantitatif dan pemeriksaan kadar magnesium serum. Analisa statistik menggunakan uji t-test dan Mann Whitney. Uji karakteristik usia, usia kehamilan, paritas, pendidikan dan status gizi kedua kelompok homogen. Tidak ditemukan perbedaan rerata kadar magnesium serum pada preeklampsia ( $1,98 \pm 0,26$  mg/dL) dengan kehamilan normal ( $1,89 \pm 0,21$  mg/dL). Rerata asupan magnesium pada preeklampsia lebih rendah  $233,6$  ( $190,1;319,3$ ) mg dibandingkan dengan kehamilan normal  $380,1$  ( $229,8;444,2$ ) mg dengan  $p=0,024$ .

Kesimpulan: tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara kadar magnesium serum pada preeklampsia dengan kehamilan normal sementara asupan magnesium pada preeklampsia lebih rendah bermakna dibandingkan dengan kehamilan normal.

.....The aim of this cross sectional comparative study was to analyze serum level of magnesium in preeclamptic pregnancies and to compare them with those in normal pregnancies. The data was collected at RSUD Tarakan on October 2013. Out of 23 women with preeclampsia and 23 women with normal pregnancies that meet our inclusion criteria given their consents to join the study. Data collated including interviews, blood pressure and mid upper arm circumference (MUAC) measurement and intake of magnesium by semiquantitative FFQ method. Statistical analysis performed by t-test and Mann Whitney. The result of the characteristic test in two groups of study shows that both groups are homogenic. There was no different between magnesium serum level in women with preeclampsia ( $1.98 \pm 0.26$  mg/dL) and normal pregnancy ( $1.89 \pm 0.21$  mg/dL) While the mean daily intake of magnesium is significantly lower in preeclampsia  $233.6$  ( $190.1;319.3$ ) mg than in normal pregnancy  $380.1$  ( $229.8;444.2$ ) mg.

Conclusion: there was no significant different between serum magnesium level in women with preeclampsia dan normal pregnancy.