

Faktor determinan terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum primipara di Kabupaten Pringsewu Lampung = Determinant factors causing postpartum blues of primiparous postpartum / Desi Ari Madiyanti

Desi Ari Madiyanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365557&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kejadian postpartum blues pada hari pertama atau ketiga persalinan masih kurang mendapat perhatian oleh perawat karena dianggap sebagai gangguan mental ringan dan hilang dalam beberapa hari postpartum, dampaknya adalah kurang optimalnya hubungan dan kelekatan antara ibu dan bayinya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor determinan terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum primipara. Desain pada penelitian ini adalah cross sectional dengan consecutive sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Hasil penelitian diidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi kejadian postpartum blues pada ibu primipara adalah faktor komplikasi persalinan dan pendapatan. Komplikasi persalinan, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya postpartum blues (p value = 0,000). Di rekomendasikan bahwa perawat harus lebih memberikan perhatian dengan intervensi pendekatan psikososial pada ibu postpartum primipara untuk mencegah terjadinya postpartum blues yang dapat mempengaruhi bonding attachment dengan bayi

ABSTRACT

The incidence of postpartum blues in the first or third day of childbirth has received less attention from nurses because is considered as a mild and that disappears within a few days of postpartum, the impact is the inadequate bonding and attachment between a mother and a baby. The purpose of this research is to identify the determinant factors of the postpartum blues incident in primiparous postpartum mothers. The research design is cross-sectional with consecutive sampling. The samples were 100 people. The results of this study is to identify that the factors affecting the incidente of postpartum blues in the primiparous mothers are complications and financial. Factor of labor complications was the most dominant factor affecting the occurrence of postpartum blues incident (p value = 0.000). It is recommended that nurses provide more attention and psychosocial approached interventions to primiparous postpartum mothers in order to prevent postpartum blues that can affect bonding and attachment with the baby.