

Hubungan antara lama rawat jumlah pembuluh darah cabang arteri koroner yang tersumbat dan hipertensi terhadap kematian pasien dalam enam tahun pasca operasi coronary artery bypass graft di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita = Association between length of stay the number of diseased coronary artery vessel and hypertension with death event in post coronary artery bypass graft surgery patients after six years in National Cardiovascular Center Harapan Kita

Hosea, Fransiscus Nikodemus, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385738&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak, yang dapat dialami oleh baik laki-laki ataupun perempuan. Salah satu tata laksana yang dapat dilakukan untuk kondisi ini adalah Coronary Artery Bypass Graft (CABG). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara lama rawat, jumlah pembuluh arteri koroner yang tersumbat, dan hipertensi terhadap kematian pasien CABG di Rumah Sakit Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Desain penelitian yang dipilih adalah retrospective cohort. Data penelitian ini diperoleh dari rekam medik pasien yang tercatat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Data pada penelitian ini melibatkan 66 subjek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diuji dengan Chi-square dan Fisher untuk menentukan nilai probabilitas (p). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara mortalitas dengan lama rawat ($RR=1,57$ IK95%= $0,60-4,08$ $p=0,35$), jumlah pembuluh arteri koroner yang tersumbat ($RR=0,90$ IK95%= $0,25-3,27$ $p=1,00$), dan riwayat hipertensi ($RR=1,59$ IK95%= $0,41-6,21$ $p=0,72$). Faktor lama rawat, jumlah pembuluh darah arteri koroner yang tersumbat, dan riwayat hipertensi tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap mortalitas subjek penelitian dalam waktu 6 tahun pasca tindakan coronary artery bypass graft.

.....

Coronary artery disease is one of the most common cause of death, that can be found both in men and women. This condition can be treated with some surgical intervention such as Coronary Artery Bypass Graft (CABG). The purpose of this study is to determine the association between length of stay, the number of diseased coronary artery vessel, and hypertension with mortality in post-CABG patients after 6 years in National Cardiovascular Center Harapan Kita. This study uses retrospective cohort as its design. Data used in this study involving 66 subjects. The data is then tested using Chi-square and Fisher to see the value of probability (p). Based on data analysis, it is found that there is no significant association between mortality with length of stay ($RR=1.57$ 95%CI= $0,60-4,08$ $p=0.346$), the number of diseased coronary artery vessel ($RR=0.90$ 95%CI= $0.25- 3.27$ $p=1.000$), and hypertension ($RR=1.59$ 95%CI= $0.41-6.21$ $p=0.716$). Length of stay, the number of diseased coronary artery vessel, and hypertension are not associated with the mortality of post-coronary artery bypass graft patients after 6 years.