

Merokok, minum alkohol, dan hubungan seksual pada remaja survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 = Smoking, alcohol drinking, and premarital sex in adolescent Indonesia demographic and health survey 2012

Ikhlash Tunggal Mulyandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20386017&lokasi=lokal>

Abstrak

Permasalahan perilaku pada remaja semakin marak terjadi sehingga menjadi fokus isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai risiko pada masa perkembangan menimbulkan kekhawatiran terjadinya perilaku berisiko kesehatan. Perilaku berisiko yang dibahas diantaranya merokok, minum alkohol, dan hubungan seksual sebelum menikah. Penelitian cross-sectional dilakukan pada remaja pria dan wanita belum kawin usia 15-24 tahun di Indonesia tahun 2012. Penelitian menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa remaja yang merokok dan minum alkohol akan meningkatkan kejadian untuk melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut lagi, semakin banyak batang rokok yang dihisap dan semakin sering frekuensi minum alkohol juga meningkatkan kejadian untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, remaja yang memiliki teman pernah berhubungan seksual lebih tinggi diantara remaja yang aktif seksual dibandingkan remaja yang belum pernah berhubungan seksual. Intervensi terintegrasi perlu dirancang sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan perilaku berisiko remaja.

Behaviors problem in adolescent often happen and become the focus on public health issues in Indonesia. The kind of risks at developmental period take the worries about health risk behaviors. The risk behaviors explored for smoking, alcohol drinking, and premarital sex. A cross sectional study was conducted among never married men and women 15-24 years olds in Indonesia in 2012. The study used data from Adolescent Reproductive Health Component of the 2012 Indonesia Demographic and Health Survey. The results showed that smoking and drinking adolescent are significantly associated with a higher likelihood of engaging in premarital sex. Further, more number of cigarettes smoked and frequent of drinking alcohol are also significantly associated with premarital sexual activity. Moreover, the adolescent with ever having sex friends were higher among sexually active youth than those who were sexually abstinent. Integrated interventions need to be designed as control and prevention of adolescent risk behaviors.