

# Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ispa pada anak berumur 12-59 bulan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan tahun 2013 = Factors that affecting the occurrence of acute respiratory infection ari in children aged 12-59 months in Tebet Barat Primary Health Center District of Tebet South of Jakarta in 2013

Muhammad Habibi Syahidi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20386370&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Kejadian ISPA pada anak berumur 12 ? 59 bulan di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta selatan mencapai angka 42,95% dan Puskesmas Kelurahan Tebet Barat merupakan Kelurahan yang memiliki prevalensi penderita ISPA yang berumur 12 ? 59 bulan terbanyak dengan proporsi tertinggi dari lima puskesmas kelurahan yang lain yaitu sebesar 23,20% (LB1-SP2TP, Puskesmas Kec. Tebet Tahun 2012). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian ISPA anak berumur 12-59 bulan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat.

Penelitian menggunakan desain studi cross-sectional dengan jumlah minimal sampel awal 220. Dari 220 sampel tersebut, hanya terdapat 104 sampel yang eligible. Sampel yang dimaksud disini adalah anak berusia 12-59 bulan yang pernah melakukan kunjungan di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat pada tahun 2013. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berisi pertanyaan yang diajukan kepada ibu/caretaker anak. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu rekam medis dari puskesmas.

Hasil menunjukkan bahwa dari 11 variabel yang dilakukan uji bivariat, variabel yang diketahui memiliki hubungan yang bermakna ( $P$  value < 0,05) dengan kejadian ISPA pada anak berusia 12 ? 59 bulan adalah pendidikan ( $OR=3,16$  : 95% CI 1,20?8,31), pengetahuan ( $OR=2,76$  : 95% CI 1,12-6,79), pendapatan keluarga ( $OR=2,75$  : 95% CI 1,10-6,86), kepadatan hunian ( $OR=5,59$  : 95% CI 2,16-14,50), perilaku merokok keluarga dalam rumah ( $OR= 8,02$  : 95% CI (2,42-26.57) dan perilaku merokok keluarga di luar rumah ( $OR=5,12$  : 95% CI 1,24-21,19). Penelitian ini menyatakan bahwa kejadian ISPA di Puskesmas Kelurahan Tebet Barat pada tahun 2013 masih tinggi.

.....

ARI occurrence in children aged 12-59 months in the sub-district primary health centers Tebet, South Jakarta reach 42.95% and Tebet Barat Primary Health Center is a place that has a prevalence of ARI patients aged 12-59 months with the highest proportion of most others in the amount of 23 , 20% (LB1-SP2TP, District Health Center. Tebet). Therefore, researcher wanted to determine the factors that influence the incidence of respiratory infection in children aged 12-59 months Tebet Barat Health Center.

This research using a cross-sectional design with sample size 220 persons. From the 220 samples, only 104 samples are eligible. The samples here are children aged 12-59 months who ever visited Tebet Barat Primary Health Center in 2013. Instrument used was a questionnaire containing questions posed to the mother/child caretaker. The Primary data was used in this study. The form of primary data from interviews and secondary data is medical records from the Tebet Barat Health Center.

The results showed that from 11 variables bivariate test, variables that are known to have a significant association ( $P$  value <0.05) with the incidence of respiratory infection in children aged 12-59 months are

education of respondent ( $OR=3,16$  : 95% CI 1,20?8,31), knowledge of respondent ( $OR=2,76$  : 95% CI 1,12-6,79), family income ( $OR=2,75$  : 95% CI 1,10-6,86), residential density ( $OR=5,59$  : 95% CI 2,16-14,50), smoking behavior of family members ( $OR= 8,02$  : 95% CI (2,42-26,57) and family smoking behavior in the outside of home ( $OR=5,12$  : 95% CI 1,24-21,19). This study suggests that the incidence of ARI in Tebet Barat Village Health Center in 2013 was still high.