

Hubungan faktor karakteristik usia, stadium kanker jenis terapi, dan dukungan suami dengan masalah psikoseksual pada pasien kanker ginekologi dan kanker payudara pascaterapi = Association of characteristic factors of age cancer stage types of treatment and partner support with psychosexual problem in post treatment gynecological and breast cancer patients

Mindyarina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20387964&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Faktor karakteristik usia, stadium kanker, jenis terapi, dan dukungan suami diprediksi telah memengaruhi timbulnya beragam permasalahan psikoseksual pada pasien kanker ginekologi dan kanker payudara. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan karakteristik usia, stadium kanker, jenis terapi, dan dukungan suami dengan masalah psikoseksual pada pasien kanker ginekologi dan kanker payudara pasca terapi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu cross sectional dengan desain penelitian korelatif dan dengan pendekatan analitis kategorik. Sebanyak 61 responden dipilih dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara jenis terapi dengan masalah psikoseksual ( $p = 0,049$ ;  $= 0,05$ ). Namun, hasil menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara usia ( $p = 0,368$ ;  $= 0,05$ ), stadium kanker ( $p = 0,636$ ,  $= 0,05$ ), dan dukungan suami ( $p = 0,172$ ,  $= 0,05$ ) dengan masalah psikoseksual. Hasil penelitian menyarankan diperlukan pembahasan/penelitian dengan studi kohort lebih lanjut mengenai hubungan faktor karakteristik dengan masalah psikoseksual.

.....

Characteristic factors of age, cancer stage, types of treatment, and partner support has predicted influences psychosexual problems in patients with gynecological and breast cancer. This study aims to identify the association of characteristics of age, stage of cancer, types of treatment, and partner support with psychosexual problems in post treatment gynecological and breast cancer patients. Cross-sectional study was used in this study. Study sample included 61 sample as respondents which selected by consecutive sampling technique. The results showed that there was significant association between types of treatment and psychosexual problem ( $p = 0.049$ ;  $= 0.05$ ). But, there was no significant association between age ( $p = 0.368$ ,  $= 0.05$ ), cancer stage ( $p = 0.636$ ,  $= 0.05$ ), and partner support ( $p = 0.172$ ,  $= 0.05$ ) with psychosexual problem. Our findings suggest a need for cohort study to discuss later about the association between the characteristics and psychosexual problems.