

# Pengaruh rehabilitasi jantung fase i terhadap toleransi aktivitas pada pasien penyakit jantung koroner di RSUD Iskak Tulungagung = Effect of phase i cardiac rehabilitation to activity tolerance of coronary heart disease patients in Iskak Hospital Tulungagung

Sutrisno, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20404127&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b>

Program rehabilitasi jantung fase 1 merupakan salah satu upaya mencapai tingkat fungsional yang memungkinkan pasien melakukan sendiri aktifitas awal dalam rangka persiapan melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah dan sebagai pencegahan efek yang kurang menguntungkan dari tirah baring yang lama.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh rehabilitasi jantung fase I terhadap peningkatan toleransi aktifitas pada pasien PJK. Desain penelitian ini menggunakan desain quasi experiment with post test-only non equivalent control group. Jumlah sampel sebanyak 24 responden.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan melakukan ADL ( $p$  value=0.004), dimana kelompok intervensi lebih tinggi dari pada kelompok kontrol, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan VO<sub>2</sub> maksimal ( $p$  value=0.220) dimana nilai VO<sub>2</sub> maksimal kelompok intervensi menunjukkan nilai yang lebih baik dari kelompok kontrol. Nilai tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, SpO<sub>2</sub> dan frekuensi nadi pada kedua kelompok menunjukkan nilai yang hampir sama dan dalam batas toleransi normal. Kesimpulan menunjukkan rehabilitasi jantung fase I berpengaruh terhadap toleransi aktivitas pasien PJK. Oleh karena itu perawat sebagai bagian dari tim program rehabilitasi jantung diharapkan memfasilitasi pasien untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap toleransi aktivitas.

### <hr><i><b>ABSTRACT</b></i>

Phase 1 cardiac rehabilitation program is one of the efforts to achieve a functional level that allows the patient to perform early activity in preparation to carry out daily activities at home and to prevent unfavorable effects of prolonged bed rest.

The purpose of this study was to identify the effect of phase I cardiac rehabilitation toward activity tolerance in patients with Coronary Heart Disease (CHD). This research design was a quasi experimental research design with post test only non-equivalent control group. The total sample was 24 respondents.

The result shows a significant difference between the ability to perform ADL ( $p$  value=0.004), in which the intervention group was higher than the control group, but there is no significant difference on VO<sub>2</sub> maximum ( $p$  value = 0.220), that the intervention group has a better value than the control group. The value of systolic blood pressure, diastolic blood pressure, SpO<sub>2</sub> and pulse rate in both groups show similar values and in the tolerance limit of normal. It can be concluded that phase I cardiac rehabilitation exercise has an effect on the activity tolerance in patients with CHD. Therefore, nurses as part of a cardiac rehabilitation program team are expected to assist patients in improving their adaptability on activity tolerance.</i>