

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi penggunaan kondom pada lelaki seks dengan lelaki di 3 kota di Indonesia tahun 2013 analisis data surveilans terpadu biologis dan perilaku tahun 2013 = Factor factor associated consistent condom use among men who have sex with men in 3 Indonesian cities 2013 secondary data analysis of integrated biological and behaviour surveillance in 2013

Khusnul Khotimah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20410984&lokasi=lokal>

Abstrak

Prevalensi HIV pada kelompok Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) selalu meningkat setiap tahun dan kelompok ini memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Promosi penggunaan kondom konsisten merupakan strategi untuk pencegahan HIV pada LSL. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom konsisten pada LSL yang memiliki pasangan tetap, pasangan tidak tetap dan pasangan komersial. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dari data Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) untuk LSL tahun 2013. Dari 602 LSL yang terpilih, konsistensi penggunaan kondom sebulan terakhir pada pasangan seks tetap 31.9%, pasangan seks tidak tetap 36.4%, dan pasangan seks komersial 42.4%. Pada analisis multivariabel menunjukkan bahwa faktor yang berasosiasi signifikan pada LSL dengan pasangan seks tidak tetap yaitu pengetahuan komprehensif ($aOR = 1.89$, 95% CI : 1.1-3.1), sumber informasi media ($aOR = 2.7$, 95% CI : 1.1-6.7), dan informasi dari petugas ahli ($aOR = 4.2$, 95% CI : 1.9-9.2) meningkatkan penggunaan kondom konsisten. Sedangkan pada pasangan seks komersial yaitu sumber informasi dari petugas ahli ($aOR = 3.5$, 95% CI : 1.1-11.1) dan persepsi LSL bahwa dirinya rentan tertular HIV ($aOR = 2.88$, 95% CI : 1.1-7.4). Intervensi ke depan harus fokus pada populasi kunci terutama LSL di semua jenis pasangan seks dan fokus pada promosi penerimaan masyarakat terkait norma pro-kondom.

.....HIV prevalence among men who have sex with men (MSM) increased current year and MSM are population at high risk for HIV infection. Promoting consistent condom use (CCU) is a key reduction strategy for HIV prevention among MSM. This thesis report the factors associated with CCU among MSM with regular, casual and commercial partners. This thesis used cross-sectional design from Integrated Biological and Behaviour Surveillance for MSM 2013. Among 602 MSM was selected, CCU last month with regular partners is 31.9%, casual partners is 36.4%, and commercial partners is 42.4%. In multivariabel analysis showed factors were associated with condom use in casual partners are comprehensive knowledge ($aOR = 1.89$, 95% CI : 1.1-3.1), information source from media ($aOR = 2.7$, 95% CI : 1.1-6.7), and source from health professional ($aOR = 4.1$, 95% CI : 1.9-9.2) were more likely to report consistent condom use. In commercial partners are source from health professional ($aOR = 3.5$, 95% CI : 1.1-11.1) and perceived for HIV infection ($aOR = 2.88$, 95% CI : 1.1-7.4). HIV intervention need to focus in key population especially MSM with all types of sex partners and it is important promote social acceptance pro-kondom norm.