

Kontribusi faktor dukungan sosial, ketidakberfungsian psikososial dan transisi tahapan rehabilitasi terhadap kecenderungan percobaan bunuh diri pada residen di balai besar rehabilitasi Badan Narkotika Nasional = Contributing social support factors psychosocial disfunction and transition stages of rehabilitation affecting resident suicide attempt in rehabilitation center of the national narcotics board

Bambang Styawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414862&lokasi=lokal>

Abstrak

Hasil proyeksi BNN memperkirakan, angka prevalensi penggunaan narkoba akan meningkat sekitar 2,8% di tahun 2015. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Balai Besar Rehabilitasi BNN telah terjadi trend meningkatnya percobaan bunuh diri sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 sebanyak 22 kasus percobaan bunuh diri pada residen yang sedang menjalani rehabilitasi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali masalah utama yaitu trend meningkatnya kasus percobaan bunuh diri pada residen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lokus dalam penelitian ini dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi BNN, dimana yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah 3 orang residen Balai Besar Rehabilitasi BNN yang sedang menjalani rehabilitasi dan pernah melakukan percobaan bunuh diri.

Berdasarkan faktor-faktor yang diteliti yaitu Dukungan Sosial, Ketidakberfungsian Psikososial dan Transisi Tahapan Rehabilitasi maka dapat diketahui bahwa setiap residen memiliki tingkatan yang berbeda antara residen yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dapat diketahui bahwa Faktor pendorong para residen melakukan percobaan bunuh diri saat menjalani rehabilitasi adalah Faktor Dukungan Sosial dan Faktor Ketidakberfungsian Psikososial, sedangkan Faktor Pencetusnya adalah Transisi Tahapan Rehabilitasi. Balai Besar Rehabilitasi BNN hendaknya melakukan pencegahan percobaan bunuh diri pada residen dengan melakukan asesmen resiko bunuh diri sehingga dapat melakukan intervensi apabila gejala-gejala itu timbul dan langkah-langkah penanganannya berupa standar operasional prosedur penanganan percobaan bunuh diri.

.....

The projection BNN estimates, the prevalence of drug use will increase by approximately 2.8 % in 2015.

The recovery process is a drug addict is not a short process and can not be done easily. Based on data obtained from sources BNN Rehabilitation Center the rising trend of suicide attempts for the residents who are undergoing rehabilitation has happened since 2012 to 2014 as many as 22 cases. The cause of suicide attempts are low Social Support, Psychosocial Dysfunction, Transition Stages of Rehabilitation.

This research uses a qualitative approach to explore the major issues and the factors that influence it. The locus of this research conducted at BNN Rehabilitation Center, while where the subjects in this study were 3 residents of BNN Rehabilitation Center who are undergoing rehabilitation and attempted suicide for 1 time. Based on these factors, which are Social Support, Psychosocial Dysfunction Transition Stages of Rehabilitation it can be seen that different levels occurs among residents. Furthermore, it is known that the driving factors for the resident attempted suicide while undergoing rehabilitation is the Social Support Factors and Psychosocial Disfunction, while the originators factor is the Transition Stages of Rehabilitation. BNN Rehabilitation Center shall have suicide prevention for residents by doing suicide risk assessment so

intervention can be done when the symptoms arise. And the handling suicide steps are based on standard operating procedure of handling suicide attempts.