

Hubungan karakteristik dan tingkat kecacatan dengan tingkat depresi pada klien kusta di RS Kusta Donorojo Jepara = Correlation between characteristics and disability level with depression level on people affected by leprosy in leprosy hospital Donorojo Jepara

Yuli Astuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20430159&lokasi=lokal>

Abstrak

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*. Penyakit ini terutama mempengaruhi kulit dan saraf tepi. Kerusakan pada saraf perifer menyebabkan adanya gangguan sensorik dan motorik dengan karakteristik berupa kecacatan. Tingkat kecacatan yang dialami klien kusta diperkirakan dapat meningkatkan tingkat depresi pada klien kusta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kecacatan dengan tingkat depresi pada klien kusta.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan teknik total sampling. Data penelitian ini diuji menggunakan uji Chi-square. Penelitian ini dilakukan di RS Kusta Donorojo Jepara Jawa Tengah dengan jumlah sampel 55 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 58,2% klien kusta mengalami kecacatan tingkat-2. Namun, tingkat depresi pada klien kusta 40% tergolong depresi sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat kecacatan dengan tingkat depresi pada klien kusta ($p < 0.05$, $OR = 4,561$). Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pelayanan keperawatan untuk mengadakan kegiatan Garden Healing dan membentuk Self Help Group di komunitas untuk membantu mengurangi depresi.

<hr>

Leprosy is a chronic infectious disease caused by *Mycobacterium leprae*. This disease mainly affects the skin and peripheral nerves. Damage to the peripheral nerves caused by sensory and motor disorders characterized by defects. The level of disability experienced by clients leprosy is expected to increase the level of depression in leprosy clients. This study aims to determine the relationship of the level of disability to the level of depression in leprosy clients.

The method used is descriptive analysis with total sampling technique. Data of this study were tested using the Chi-square test. This research was conducted at the Leprosy Hospital Donorojo Jepara, Central Java with a sample of 55 people.

The results of this study showed that 58.2% of clients leprosy disability level-2. However, the rate of depression in leprosy clients 40% classified as moderate depression. These results indicate there is a relationship between the level of disability to the level of depression in the client leprosy ($p < 0.05$, $OR = 4.561$). These results can be the basis for nursing services to conduct Garden Healing and Self Help Group formed in the community to help reduce depression.