

Gambaran kejadian depresi postpartum pada ibu dengan riwayat komplikasi persalinan = Descriptive of postpartum depression in women who had complication of labor

Rahmatul Hidayah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431249&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Ibu dengan riwayat komplikasi persalinan dapat mengalami depresi postpartum yang ditandai dengan cemas, anhedonia, insomnia, merasa lelah, bersalah, dan muncul keinginan untuk menyakiti diri-sendiri atau bayinya. Penelitian ini bertujuan utamanya untuk mengidentifikasi kejadian depresi postpartum pada ibu dengan riwayat komplikasi persalinan. Desain pada penelitian ini adalah cross sectional dengan jumlah responden 107 ibu berriwayat komplikasi persalinan yang dipilih secara consecutive sampling, kemudian dianalisis secara univariat. Instrumen pada penelitian ini ialah Edinburgh Postpartum Depression Scale. Persentase terbanyak kejadian depresi postpartum dialami oleh ibu dengan riwayat komplikasi perdarahan saat persalinan (75%). Kemudian sebanyak 71,4% ibu dengan riwayat komplikasi persalinan muntah mengalami depresi postpartum, dan sebanyak 66,7% untuk masing-masing komplikasi durasi persalinan lama dan anemia. Sedangkan kejadian depresi postpartum pada ibu dengan riwayat komplikasi persalinan sesarea sebanyak 53,3%. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan tenaga kesehatan dapat mengenali tanda dan gejala depresi postpartum sejak dini, sehingga dapat dilakukan penanganan segera agar tidak menjadi masalah yang lebih kompleks.

ABSTRACT

Mothers with a history of birth complications may experience postpartum depression, is characterized by anxiety, anhedonia, insomnia, feeling tired, guilty, and the willingness to harm themselves or their babies. The main aim of this study is to identify the incidence of postpartum depression in women with a history of childbirth complications. The design used was cross sectional with the number of respondents 107 women with history of birth complications were selected by consecutive sampling, then analyzed by univariate. The instrument is Edinburgh Postpartum Depression Scale. Highest percentage incidence of postpartum depression experienced by the mother with history of bleeding complications during childbirth (75%). Then as much as 71,4% of women with a history of vomiting during labor experienced postpartum depression, and as much as 66,7% for each of the complications of prolonged labor and anemia. While the incidence of postpartum depression in women with a history of cesarean delivery complications 53,3%. Accordingly, the expected health providers can recognize the signs and symptoms of postpartum depression early, so that immediate action can be done so as not to become a more complex problem.