

Faktor prediktif klinis metastasis pada karsinoma sel ginjal = Clinical predictive factor of metastases in renal cell carcinoma

Fina Widia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435201&lokasi=lokal>

Abstrak

Karsinoma sel ginjal terhitung sekitar 3% dari kanker pada orang dewasa dan 85% dari semua keganasan primer ginjal. Tumor ini biasanya tidak memberikan gejala hingga penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Metastasis pada kelenjar getah bening dan metastasis jauh diketahui merupakan faktor prognostik yang penting pada karsinoma sel ginjal. Parameter klinis diperlukan untuk memprediksi metastasis sebelum operasi. Penelitian ini merupakan penelitian prospektif dengan mengambil data dari rekam medis dari Januari 1995 hingga Desember 2015 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini mengevaluasi faktor prediktif klinis untuk kejadian metastasis pada karsinoma sel ginjal.

.....

Renal cell carcinoma (RCC) accounts for about 3% of cancers in adults as well as 85% of all primary malignancies arising from the kidney. RCC is commonly large at presentation and symptoms may not occur until relatively late in the disease. Lymph node and distant metastases were known as the prognostic factor in renal cell carcinoma. Clinical parameters are needed to predict the metastases preoperatively. This is a prospective-analytic using medical record data from January 1995 - December 2015 at Cipto Mangunkusumo Hospital. This study evaluate clinical predictive factors for metastatic renal cell carcinoma incidence.