

# Gambaran hasil pemeriksaan klasik apl acl, anti-?2gpi, dan la , dan aps pada pasien yang dicurigai aps mengalami kematian janin > 10 minggu di RSCM = Proportion of classic laboratory examination of apl acl anti 2gpi and la and aps in the suspected aps patient had a pregnancy loss 10 wga at RSCM

Angga Januarsa Suryadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435271&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas perbandingan hasil dari pemeriksaan klasik aPL, dan aPS sehingga dokter, sebagai penyedia layanan kesehatan, dapat mengetahui pemeriksaan yang lebih baik dari pemeriksaan sebelumnya, yang berguna untuk menetapkan diagnosis maupun strategi penanganan selanjutnya..Penelitian ini dilakukan dengan desain potong lintang deskriptif.

Semua pasien hamil normal tidak memiliki satupun pemeriksaan klasik (LA, aCL dan anti-?2GPI) dan aPS yang positif. Dari penelitian ini, didapatkan pada pasien yang dicurigai APS tetapi memiliki hasil negatif terhadap aCL, anti- ?2GPI , dan LA, ternyata sebanyak 5 (18,5%) pasien memiliki hasil positif pada pemeriksaan aPS.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the comparison of the results of classical aPL and APS so the doctor, as health care providers, can know better inspection of previous examinations, which are useful to establish the diagnosis and treatment strategies. This study was a descriptive cross-sectional. All pregnant patients normally do not have any classic examination (LA, aCL and anti-?2GPI) and aPS were positive. It was found in patients with suspected APS, but has a negative result against aCL, anti- ?2GPI, and LA, it turns out as many as 5 (18.5%) patients had positive results on the examination of the APS.