

# Hemodialysis dan kecepatan aliran darah dengan adekuasi hemodialisis pada pasien gagal ginjal terminal = Correlation between frequency, duration of hemodialysis and quick of blood with adequacy hemodialysis toward ends stage renal disease

Simanungkalit, Siska Ruthvina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20441114&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b>**

Peresepan dosis hemodialisis meliputi frekuensi, lama waktu hemodialisis dan kecepatan aliran darah. Peresepan dilakukan untuk menghitung pencapaian adekuasi dengan menggunakan rumus Kt/V. Adekuasi hemodialisis berperan penting dalam penilaian keefektifan tindakan hemodialisis yang diberikan kepada pasien gagal ginjal terminal. Penelitian deskritif korelasi dengan pendekatan cross-sectional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi, lama waktu hemodialisis dan kecepatan aliran darah dengan adekuasi hemodialisis. Pengambilan data diperoleh dari data yang sudah berlangsung (retrospektif) dari bulan Maret-Mei 2015. Jumlah sampel pada penelitian adalah 96 orang yang ditentukan berdasarkan total sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara frekuensi, lama waktu hemodialisis dan kecepatan aliran darah ( $p=0,008$ ,  $\beta=0,05$ ) dengan adekuasi hemodialisis. Perawat perlu memperhatikan pedoman pengaturan kecepatan aliran darah dalam pencapaian adekuasi hemodialisis.

### **<hr><i><b>ABSTRAK</b></i>**

The prescribing of hemodialysis dose cover the frequency, duration of hemodialysis and quick of blood. Prescribing was conducted to calculate the adequacy outcome by using the formula Kt/V. Hemodialysis adequacy has an important role in assesing the effectiveness of hemodialysis actions to patients with end stage of renal disease. Correlation descriptive inquiry through cross-sectional aims to know the correlation between frequency, duration of hemodialysis and quick of blood with adequacy hemodialysis. Data collection retrieved from retrospective data from March to May 2015. The number of samples were 96 people who are determinated based on total sampling. The results indicated that there was a significant correlation between the frequency, duration of hemodialysis and quick of blood ( $p=0,008$ ,  $\beta=0,05$ ) with adequacy of hemodialysis ( $p = 0.008$ ). Nurses need to pay attention to the guidelines of regulation of quick of blood in the outcome of hemodialysis adequacy.</i>