

Status gizi selama hamil dengan persepsi ketidakcukupan ASI di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tahun 2011 = Nutritional status during pregnancy with the perception of breast milk inadequacy in Tanjung Priok Primary Health Care in 2011

Panjaitan, Marisi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20443155&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pemahaman ketidakcukupan ASI didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang ibu telah atau menganggap dirinya tidak lagi memiliki ketersediaan ASI dan hal ini merupakan alasan utama lepas susu lebih awal. Penelitian ini merupakan penelitian analitik cross sectional dengan menggunakan data primer dan sekunder yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi selama hamil dengan persepsi ketidakcukupan ASI di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi yang tidak sesuai rekomendasi, umur 30 tahun, ibu bekerja, hamil anak pertama, tidak adanya bimbingan laktasi, pengetahuan, dan dukungan nakes mempengaruhi ketidakcukupan ASI. Agar persepsi ibu tentang ketidakcukupan ASI tidak dijadikan alasan utama untuk menghentikan ASI maka perlunya peningkatan status gizi selama hamil serta penyuluhan oleh nakes tentang ASI Eksklusif.

<hr>

ABSTRACT

The understanding off breast milk is defined as asituation where a mother has or thinks she is no longer has the availability of brenst milk and this is the main reason of early off milk. This research is a cross sectional analytic study using primary and secondary data aimed to determine the relationship between nutrional status during pregnancy with the perceived insufficient milk in Tanjung Priok public health center that has not been done before. The result shovvs that nutritional status that is not relevant to the recommendation, age under 30 years old, working mother, first pregnancy, no gvidance about lactation, knowledge, and support from health worker are affecting inadequacy of breast milk. In order mothers perception about breast milk inadequacy can not be use as the main reason to stop breast feeding, therefore improving nutritional status during pregnancy and counceling by the health worker are needed.