

Evaluasi penggunaan antihipertensi konvensional dan kombinasi konvensional-bahan alam pada pasien hipertensi di Puskesmas wilayah Depok / Sefni Gusmira

Sefni Gusmira, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20443235&lokasi=lokal>

Abstrak

Proporsi penyakit hipertensi di Depok tahun 2002 adalah 57,4%. Puskesmas telah melakukan terapi terhadap penyakit

ini dengan memberikan antihipertensi. Selain obat yang biasa diberikan dokter (konvensional), ternyata banyak pasien

mengkonsumsi tanaman yang berkhasiat obat (obat bahan alam). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek

terapi antihipertensi kombinasi konvensional-bahan alam terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di 5 Puskesmas

di Depok. Penelitian yang didesain kohort retrospektif ini menggunakan sampel pasien hipertensi yang datang ke

Puskesmas. Pasien yang bersedia ikut penelitian sebanyak 123 pasien, dan dikelompokkan dalam kelompok terapi

konvensional (74 orang) dan terapi kombinasi konvensional-bahan alam (49 orang). Sebagian besar pasien hipertensi

yang datang ke Puskesmas wilayah Depok adalah perempuan, usia 50-59 tahun, menikah, berasal dari suku Betawi,

berpendidikan rendah, tidak bekerja/ibu rumah tangga, berpenghasilan rendah dan menderita hipertensi tahap II.

Penurunan tekanan darah diastolik pada kelompok terapi kombinasi konvensional-bahan alam lebih baik dibandingkan

kelompok terapi konvensional, sebaliknya penurunan tekanan darah sistolik lebih baik pada kelompok terapi konvensional dibandingkan kelompok terapi kombinasi konvensional-bahan alam. Namun tidak ada perbedaan

bermakna antara keduanya ($p>0,05$). Kontinuitas penggunaan obat mempengaruhi tekanan darah sistolik ($p<0,05$).

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum terlihat jelas pengaruh penggunaan obat bahan alam yang digunakan

bersamaan dengan obat konvensional dalam menurunkan tekanan darah.

Evaluation on Conventional Antihypertension Use and Natural-Conventional Combination on Patient with Hypertension. The proportion of hypertensive disease in Depok city was 57.4% in 2002. Primary health centers had

given antihypertensive medication. In addition to the drugs commonly given by a doctor (conventional), many patients

took medicinal plants (natural medicine). This study aimed to evaluate the effects of combination therapy of conventional-herbal on blood pressure in hypertensive patients in five primary health centers in Depok. This retrospective cohort study used samples of hypertension patients who came to primary health centers.

Patients who were

willing to join the study were 123 patients and grouped in to conventional therapy group (74 people) and combination

of conventional-herbal therapy group (49 people). The majority of hypertensive patients who came to the health centers

area of Depok were women, aged 50-59 years old, married, came from ethnic Betawi, less educated, unemployed/

housewives, low income and suffering from hypertension stage II. Combination therapy of conventional-herbal had

better effect on diastolic and conventional therapy had better effect on systolic. However, no significant difference

between them ($p>0.05$). The continuity of treatment affected systolic blood pressure ($p<0.05$). This study showed that

had not seen clearly influence of herbal that is used combination with conventional drugs in lowering blood pressure.