

Deteksi tingkat depresi pasien diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan gejala komplikasi diabetes, durasi diabetes, dan perilaku manajemen diri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo = Detecting the depression level of patients with type 2 diabetes mellitus based on diabetes complication, duration diabetes, and diabetes self care activities in Cipto Mangunkusumo Hospital

Eni Tri Fatimah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458626&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRACT
**

Depresi merupakan gangguan kejiwaan yang banyak terjadi pada pasien Diabetes Mellitus DM . Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 beresiko tinggi mengalami depresi ringan dan depresi berat. Gejala komplikasi diabetes, durasi diabetes, dan perilaku manajemen diri merupakan faktor ; faktor yang diduga mempengaruhi depresi pada pasien DM tipe 2. Metode analisis regresi logistik ordinal digunakan untuk menentukan faktor ; faktor yang paling mempengaruhi depresi dan mendeteksi tingkat depresi berdasarkan faktor ; faktor yang paling mempengaruhi depresi. Hasil dari penelitian ini adalah 43.6 pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengalami depresi, yang terdiri dari 22.7 mengalami depresi ringan, dan 20.9 mengalami depresi berat. Depresi pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hanya dipengaruhi oleh gejala komplikasi diabetes yang tediri dari hipoglikemia, ophthalmologi, dan neuropati sensorik, sehingga faktor ; faktor tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi depresi.

<hr>

**ABSTRACT
**

Depression is a mental disorder that often exists within patients with diabetes mellitus. Several studies displays that the patients with type 2 diabetes mellitus has an increased risk of minor and major depression. The symptom of diabetes complications, duration diabetes, and the self management behavior are predicted to be the contributing factors that influence depression in the patient with type 2 diabetes mellitus. This research employs ordinal logistic regression method to determine the most prominent factor affecting depression and to detect the level of depression according to the said factors. The result of this research displays that depression occurs in 43.6 of the patient with type 2 diabetes mellitus in Cipto Mangunkusumo hospital, with the following breakdown 22.7 patients that suffer from minor depression and 20.9 patients suffer from major depression. Depression in the patients of Cipto Manungkusomo hospital with type 2 diabetes mellitus is only affected by the symptoms of diabetes complication which constitute of hypoglycemia, ophthalmology, and sensory neuropathy. Thus, these factors can be used to detect depression.