

Pengaruh suhu dan kelembaban udara terhadap daerah jelajah kukang Jawa (*Nycticebus javanicus* e. *geoffroy*, 1812) di Talun Desa Cipaganti, Garut = Effect of temperature and humidity on home range of slow loris (*Nycticebus javanicus* e. *geoffroy*, 1812) at Talun Cipaganti Village, Garut

Nur Zakiyyah Elsalam, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458678&lokasi=lokal>

Abstrak

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap daerah jelajah kukang Jawa *Nycticebus javanicus* di Talun Desa Cipaganti, Garut. Penelitian dilakukan selama 450 jam yaitu pada bulan Maret - April 2017 dari pukul 17.00--05.00 WIB. Metode focal animal instantaneous sampling digunakan untuk mencatat seluruh perilaku dari 3 individu kukang Jawa jantan dewasa dalam interval waktu 5 menit tanpa jeda. Data GPS dan data suhu lingkungan serta kelembaban udara diambil bersamaan dengan pengambilan data perilaku. Kukang Jawa ditemukan pada berbagai ketinggian 1348 m di atas permukaan laut mdpl - 1518 mdpl. Luas daerah kukang Jawa berkisar antara 1,90 ha - 20,35 ha. Hasil menunjukkan bahwa luasan daerah jelajah kukang Jawa berbanding lurus terhadap kenaikan suhu lingkungan. Luasan daerah jelajah kukang Jawa berbanding terbalik terhadap kenaikan kelembaban udara. Pola distribusi pemanfaatan area pada first shift lebih luas dibandingkan dengan pola distribusi pemanfaatan area pada second shift. Adanya tumpang tindih overlap pada daerah jelajah dua kukang Jawa disebabkan karena dua kukang Jawa tersebut berada dalam satu kelompok unit yang sama sehingga menempati daerah yang sama.

.....Research has been conducted to know the effect of environmental factors on home range of slow loris *Nycticebus javanicus* E. Geoffroy, 1812 at Talun Cipaganti Village, Garut. The study was conducted for 450 hours in March 2017 April 2017 from 17 00 p.m. to 05 00 a.m. The focal animal instantaneous sampling method is used to record 3 adult male slow loris within 5 minute intervals without interlude. GPS data, ambient temperature and relative humidity data was collected at the same time with behavior observations. Pattern of utilization distribution area became wider at the first shift than at the second shift. Javan slow loris were found at different altitudes 1348 m above sea level asl - 1518 m asl. Slow loris home range is about 1.90 ha - 20.35 ha.

The results show that size of home range directly proportional with ambient temperature while size of home range inversely proportional with relative humidity. There is an overlap between two home range of slow loris which is caused by these two loris is in the same unit so they live in the same area.