

Analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada anak dengan gagal ginjal kronik yang mendapatkan tindakan hemodialisa di ruang perawatan anak lantai 1 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo = analysis urban health nursing practice in child with chronic kidney disease during hemodialysis therapy in first floor children ward RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

Simbolon, Christina Natalin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20459786&lokasi=lokal>

Abstrak

Gagal ginjal kronik pada anak merupakan salah satu penyakit yang khas pada masyarakat perkotaan. Salah satu komplikasi yang terjadi pada gagal ginjal kronik adalah edema yaitu kondisi kelebihan cairan di dalam tubuh. Karya ilmiah ini bertujuan memberikan gambaran asuhan keperawatan melalui pendekatan KKMP pada pasien anak dengan gagal ginjal kronik yang mendapat tindakan hemodialisa dengan gejala edema anasarca dan edema paru. Intervensi yang diberikan adalah manajemen pembatasan cairan, intervensi ini diterapkan selama 7 hari. Hasil evaluasi didapatkan, kelebihan volume cairan teratasi ditandai dengan edema sudah tidak ada dan keadaan umum pasien baik. Intervensi ini dilakukan sejalan dengan intervensi kolaborasi dengan dokter, ahli gizi, farmasi dan bagian hemodialisa. Oleh karena itu intervensi manajemen pembatasan cairan perlu diterapkan secara disiplin di pelayanan keperawatan sebagai intervensi mandiri.

.....

Chronic Kidney Disease in children is one of the speciality problem in urban community. One of the most serious complication this disease is oedema which means excess fluid volume in the body. The purpose of this case study to describe about nursing care with urban health nursing practice approach in child with anasarca and lung oedema caused by CKD during hemodialysis therapy. The intervention given was fluid restriction management in 7 days of care. The result was excess fluid volume could be resolved with there was no oedema and general physically was good. These interventions are conducted in line with collaborative interventions with doctorss, nutritionists, pharmacists and hemodialysis departments. So that, this intervention has to be applied consistently in nursing care as independent intevension for nurse.