

# Faktor risiko tingginya angka sindrom pascakolesistektomi spk di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2015 = Risk factors for high incidence of postcholecystectomy syndrome pcs in dr Cipto Mangunkusumo Hospital at 2015

Glenda Angeline T., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20460536&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Latar belakang : Insiden sindrom pascakolesistektomi SPK di RS dr.Cipto Mangunkusumo RSCM pada tahun 2012 sebesar 54.29 , lebih tinggi daripada penelitian di negara lain.

Tujuan : Studi ini bertujuan mencari faktor risiko SPK untuk mengupayakan turunnya insiden SPK.

Metode : Dilakukan suatu studi cross-sectional terhadap subjek yang menjalani kolesistektomi pada periode Januari - Desember 2015.

Hasil : Total 112 pasien menjalani laparoskopik kolesistektomi. Insiden SPK didapatkan sebesar 45,5 . Pada analisis bivariat didapatkan hubungan signifikan antara SPK dengan lama keluhan praoperasi  $p=0,033$ ,  $OR=2,29$  , flatulens praoperasi  $p=0,000$ ,  $OR=16,48$  , gejala non-spesifik praoperasi  $p=0,000$ ,  $OR=6,93$  , persepsi pasien  $p=0,000$ ,  $OR=5,723$  . Pada analisis regresi logistik didapatkan flatulens praoperasi  $p=0,000$ ,  $OR=17,152$  , gejala non-spesifik praoperasi  $p=0,012$ ,  $OR=3,984$  dan persepsi pasien praoperasi  $p=0,003$ ,  $OR=5,907$  merupakan faktor risiko untuk SPK. Rerata lama observasi pascaoperasi adalah 14,95 bulan.

Kesimpulan : Tingginya angka SPK di RSCM akibat jumlah subjek dengan gejala praoperasi non-spesifik yang lebih tinggi, persepsi praoperasi yang buruk, dan perbedaan lama observasi pascaoperasi.

<hr><i>Background: Incidence of postcholecystectomy syndrome in Cipto Mangunkusumo Hospital at 2012 is 54.29 , higher than ever reported.

Objective: The objective of the study was to identify risk factors of PCS and decrease its incidence.

Method: A cross sectional study was performed enroll all subjects that underwent cholecystectomy from January to December 2015.

Result: All 112 subjects underwent laparoscopic cholecystectomy. We found the incidence for PCS to be 45.5 . Bivariate analysis showed there were significant correlation between PCS and preoperative symptom duration  $p 0.033$ ,  $OR 2.29$  , preoperative flatulence  $p 0.000$ ,  $OR 16.48$  , non specific preoperative symptoms  $p 0.000$ ,  $OR 6.93$  , poor preoperative perception  $p 0.000$ ,  $OR 5.723$  . Multivariate logistic regression analysis showed that only preoperative flatulence  $p 0.000$ ,  $OR 17.152$  , non specific preoperative symptoms  $p 0.012$ ,  $OR 3.984$  , and poor preoperative perception  $p 0.003$ ,  $OR 5.907$  were independent predictive factors for PCS. Mean of postoperative observation was 14.95 months.

Conclusion: High incidence of PCS in RSCM was influenced by larger number of subject with non specific preoperative symptoms, poor preoperative perception and the difference in duration for postoperative observation.</i>