

# Uji aktivitas penghambatan enzim arginase dan uji aktivitas antioksidan fraksi ekstrak etanol Daun Senggani (*Melastoma malabathricum* L.) yang terstandar = arginase inhibitory and antioxidant activity of fraction from standardized ethanolic extract of *Melastoma malabathricum* L leaves

Sembiring, Elin Novia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467638&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Kondisi disfungsi endotel disebabkan oleh menurunnya ketersediaan L-Arginin akibat meningkatnya aktivitas arginase dan stres oksidatif. Berdasarkan penggunaan tradisionalnya untuk memperlancar aliran darah, serta kandungan senyawa yang potensial sebagai penghambat arginase dan antioksidan, maka dilakukan pengujian aktivitas penghambatan arginase dan aktivitas antioksidan senggani *Melastoma malabathricum* L. Simplisia batang, buah, bunga, daun diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 70. Ekstrak teraktif penghambat arginase ditentukan nilai IC<sub>50</sub>, distandardisasi dan difraksinasi dengan n-heksan, etil asetat dan metanol.

Ekstrak etanol 70 daun memiliki aktivitas penghambatan arginase tertinggi dibandingkan bagian tanaman senggani lainnya dengan nilai IC<sub>50</sub> 62,89 g/mL, serta mengandung senyawa identitas kuersetin 0,27. Fraksi etil asetat menghambat arginase dengan nilai IC<sub>50</sub> 21,24 g/mL, dan memiliki nilai IC<sub>50</sub> 4,95 µg/mL untuk aktivitas antioksidan dengan metode FRAP dan 12,44 µg/mL dengan metode DPPH. Kadar flavonoid total, fenol total dan kuersetin dalam fraksi etil asetat berturut-turut adalah 16,7; 37,91; dan 3,7. Fraksi teraktif dalam menghambat arginase dan sebagai antioksidan dari ekstrak etanol 70 daun senggani adalah fraksi etil asetat.

.....Endothelial dysfunction is primarily due to reduction in Nitric Oxide NO bioavailability caused by upregulation of arginase and oxidative stress. Based on traditional used for blood flowing, and potential compounds as arginase inhibitor and antioxidant, research on arginase inhibitory and antioxidant activity of Senggani *Melastoma malabathricum* L. has conducted. Stem, fruit, flower and leaf were extracted with 70 ethanol by maceration. The most active extract was determined for IC<sub>50</sub> value, standardized, and fractionated with n hexane, ethyl acetate and methanol.

The most active extract on arginase inhibition compared to other parts of the plant was leaf extract with IC<sub>50</sub> 62,89 g mL, and 0,27 quercetin as marker compound. Ethyl acetate fraction inhibited arginase with IC<sub>50</sub> value 21,24 g mL IC<sub>50</sub> value 4,9 g mL for antioxidant activity by FRAP method and 12,44 g mL for antioxidant activity by DPPH method. Total flavonoid content, total phenolic content and quercetin content in ethyl acetate fraction was 16.7, 37.91, and 3.7. The most active fraction on arginase inhibition and antioxidant activity from 70 ethanolic leaf extract of senggani was ethyl acetate fraction.