

Hubungan dukungan sosial dengan risiko kambuh pada pecandu NAPZA (opioid) yang menjalani program terapi rumatan metadon = Relationship between social support and risk for relapse of substance addicted user (opioid) with methadone maintenance treatment

Eviyanti NurmalaSari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20473784&lokasi=lokal>

Abstrak

Pecandu NAPZA yang menjalani Program Terapi Rumatan Metadon PTRM memiliki risiko untuk kambuh karena mereka akan dihadapkan dengan tekanan selama menjalani terapi. Dalam rangka mencegah pasien PTRM agar tidak kambuh diperlukan dukungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dukungan sosial ditinjau dari sumber dukungan dan lima dimensi instrumental, emosional, penghargaan, informasional, dan integritas sosial dengan risiko kambuh pada pecandu NAPZA yang menjalani PTRM.

Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasi cross sectional dengan jumlah sampel 89 responden.

Penelitian ini menggunakan kuisioner The Medical Outcomes Study MOS Social Support Survey MOS-SSS dan Advance Warning of Relapse AWARE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan risiko kambuh pada pecandu NAPZA yang menjalani PTRM $r = -0,241$; $p \text{ value} = 0,023$. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan intervensi yang berhubungan dengan dukungan sosial di pelayanan PTRM.

.....Substance addicted user who undergo Methadone Maintenance Treatment MMT have a risk for relapse because during therapy they will be under pressure. In order to prevent patients from relapse, they are required social support.

The research aimed to identify the relationship between social support that be observed from social network and five social support dimension tangible, emotional, appraisal, informational, and social integrity and risk for relapse of substance addicted user with methadone maintenance treatment.

The design of this study was cross sectional with a sample size of 89 respondents. This study used The Medical Outcomes Study MOS Social Support Survey MOS SSS and Advance Warning of Relapse AWARE.

The study found that there is a negative correlation between social support with risk for relapse $r = 0,241$ $p \text{ value} = 0,023$. The results of this study is expected will increase activities related to social support in MMT service.