

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan skrining penyakit tidak menular (PTM) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota Depok tahun 2016 = Factors associated with the use of noncommunicable diseases (NCD) screening on civil servants in Balaikota Depok 2016

Indah Jamiatun Hasanah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20475975&lokasi=lokal>

Abstrak

Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman $p = 0,01$ dan $evaluated\ need\ p = 0,041$ merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, $perceived\ need$ dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM.

PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh $evaluated\ need$, $perceived\ need$, dan pengetahuan $OR = 2,24$, $95\ CI = 1,21\ ndash; 4,16$.

.....Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support $p\ 0,01$ and $evaluated\ need\ p\ 0,041$ were determinants of PNS NCD screening, $perceived\ need$ and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by $evaluated\ need$, $perceived\ need$, and knowledge $OR\ 2,24$, $95\ CI\ 1,21\ 4,16$.