

Psikopatologi pada kehamilan remaja yang berhubungan dengan luaran persalinan = Psychopathology in teenage pregnancy related to delivery outcomes.

Arie Aldila Pratama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20478803&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar belakang: Kehamilan remaja merupakan suatu masalah kesehatan dan sosial. Beberapa penelitian telah mempelajari psikopatologi pada kehamilan remaja khususnya depresi, psikotik, bipolar, gangguan cemas dan gangguan nafsu makan. Hingga saat ini belum ada penelitian yang menelaah hubungan psikopatologi pada kehamilan remaja dengan luaran persalinan. Tujuan: Mengetahui hubungan psikopatologi pada kehamilan remaja dengan luaran persalinan.

Metode: Penelitian potong lintang ini dilakukan di RSCM dan RSUT pada bulan Mei 2017-Januari 2018. Pengambilan subjek dilakukan secara berurutan (consecutive) yang memenuhi kriteria penerimaan dan tidak termasuk dalam kriteria penolakan sampai dengan target subjek terpenuhi. Subjek akan diminta untuk mengisi kuesioner SCL-90. Setelah mengisi kuesioner, subjek terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan gejala psikopatologi dan kelompok tanpa gejala psikopatologi, dimana masing-masing kelompok akan dilihat luaran persalinannya.

Hasil: Didapatkan hubungan yang bermakna antara kelompok dengan gejala psikopatologi dengan luaran persalinan; usia gestasi ($p < 0,001$), skor Apgar ($p < 0,001$) dan berat lahir bayi ($p < 0,001$).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara luaran persalinan dengan kehamilan remaja disertai gejala psikopatologi dibandingkan tanpa gejala psikopatologi.

<hr>

Background: Teenage pregnancy is a health and social problems. Several studies have studied psychopathology in teenage pregnancy especially depression, psychotic, bipolar, anxiety disorder and appetite disorder. Until now there has been no research that examines the correlation of psychopathology in teenage pregnancy with delivery outcomes.

Aim: To determine the correlation of psychopathology in teenage pregnancy with delivery outcomes.

Methods: This cross sectional study was conducted at RSCM and RSUT in May 2017-January 2018.

Subjects were taken consecutively that met the inclusion criterias and were not included in the exclusion criterias until the subject target was met. Subjects will be required to complete the SCL-90 questionnaire. After filling out the questionnaires, the subjects were divided into two groups, group with psychopathological symptoms and without psychopathological symptoms, in which each group would be seen the delivery outcomes.

Results: There was a significant correlation between group with psychopathological symptoms with delivery outcome; time of delivery ($p < 0,001$), Apgar score ($p < 0,001$) and birth weight ($p < 0,001$).

Conclusion: There was a significant correlation between delivery outcomes and teenage pregnancy with psychopathological symptoms compared with no psychopathological symptoms.