

**Pengaruh depresi, conduct problem, dan hiperaktivitas terhadap penggunaan tembakau pada siswa SMA di wilayah perkotaan Jakarta = The effects of depression, conduct problem, and hyperactivity on tobacco use among High School Students in urban area of Jakarta / Ellan Jaya Septiyono**

**Ellan Jaya Septiyono, author**

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20488669&lokasi=lokal>

---

**Abstrak**

**<b>ABSTRAK</b><br>**

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan tembakau di kalangan remaja (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Siswa sekolah menengah dianggap yang terbesar kelompok remaja yang menggunakan tembakau. Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai prediktor penggunaan tembakau; salah satunya adalah masalah kesehatan mental. Tujuan dari ini penelitian adalah untuk menguji efek depresi, melakukan masalah, dan hiperaktif / tidak aktif pada penggunaan tembakau di kalangan siswa sekolah menengah. Di dalam studi longitudinal, kami bertujuan untuk menguji efek distal dan proksimal mental masalah kesehatan pada penggunaan tembakau. Tiga model dinilai dalam penelitian ini; satu distal model dan dua model proksimal. Partisipan penelitian adalah siswa dari 5 SMA sekolah di daerah perkotaan Jakarta ( $N = 530$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada model-modelnya signifikan; menunjukkan tidak ada efek signifikan dari masalah kesehatan mental penggunaan tembakau di kalangan siswa. Namun, kami menemukan efek signifikan dari perilaku tersebut masalah di kelas 10 pada penggunaan tembakau di kelas 11 ( $\beta = 0,156$ ,  $df = 1$ ,  $p < 0,05$ ) dan kelas 12 ( $\beta = 0,159$ ,  $df = 1$ ,  $p < 0,05$ ). Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan untuk melakukan penelitian serupa pada remaja yang lebih muda; misalnya di antara sekolah menengah pertama siswa.

<hr>

**<b>ABSTRACT</b><br>**

In recent years, there has been an increase in tobacco use among adolescents (Indonesian Ministry of Health, 2018). Middle school students are considered the largest group of adolescents who use tobacco. Several factors have been identified as predictor of tobacco use; one of them is a mental health problem. The aim of this study is to examine the effects of depression, doing problems, and hyperactivity / inactivity on tobacco use among middle school students. In a longitudinal study, we aim to examine the distal and proximal effects of mental health problems on tobacco use. Three models were assessed in this study; one distal model and two proximal models. The study participants were students from 5 high schools in urban areas of Jakarta ( $N = 530$ ). The results of the study showed that none the models are significant; showed no significant effects of mental health problems on tobacco use among students. However, we found a significant effect of this behavior problems in class 10 on tobacco use in class 11 ( $\beta = 0.156$ ,  $df = 1$ ,  $p < 0.05$ ) and grade 12 ( $\beta = 0.159$ ,  $df = 1$ ,  $p < 0.05$ ). Based on the results of this study, we recommend conducting a similar study in younger adolescents; for example among junior high schools student.

